

Numeralia 2011

Mortalidad Materna en México



Contenido

Presentación	5
Notas técnicas	6
Por residencia habitual de la mujer	7
Por tipo de afiliación en salud	43
Por lugar de ocurrencia de la defunción	51

El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) tiene entre sus mandatos, crear un sistema de indicadores que facilite el análisis, la evaluación, el monitoreo y la vigilancia sistemática de procesos y resultados de políticas, estrategias, programas y servicios encaminados a reducir la mortalidad materna (MM), así como contar con los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a información confiable, oportuna y periódica que haga posible su uso para el análisis y la prevención de las muertes maternas en México. La publicación de la Numeralia y de los Indicadores 2011 obedece a dicho mandato.

La Numeralia brinda una mirada rápida a la información más relevante por entidad federativa, con el objetivo de resaltar aquellos aspectos particulares en el comportamiento de la MM de acuerdo con la entidad de residencia habitual, la condición de aseguramiento en salud de la mujer y la ocurrencia de la defunción, por ello no pretende que el o la lectora tenga una visión comparable por entidad federativa o por lugar de defunción. Esta información podrá ser consultada en la publicación de los Indicadores.

La Numeralia de Mortalidad Materna en México para el año 2011 se elaboró a partir de la información obtenida de la base de datos de mortalidad de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud (SSA), que año con año es publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) después de ser validada. Se han incluido en esta sistematización los porcentajes de datos sociodemográficos y de acceso a servicios de salud que se consideran de mayor relevancia, para que quienes estén interesados en esta problemática tengan acceso a información desagregada para cada estado de la República Mexicana; asimismo, se ha incorporado la Razón de Mortalidad Materna (RMM), definida como el número de defunciones de mujeres mientras se encuentren embarazadas o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo y debida a cualquier causa relacionada con, o agravada por, el embarazo mismo o su atención (con exclusión de las muertes accidentales o incidentales), en un determinado año y por cada 100 mil nacidos vivos estimados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Este año se incluyen dos estimaciones de la RMM. La primera utiliza como denominador las estimaciones anteriores presentadas por el CONAPO con base en las proyecciones de la población de México 2005-2030. En la segunda estimación se utilizaron los nuevos cálculos del CONAPO, que recién se publicaron en 2012, obtenidos a partir de la conciliación demográfica 1990-2010 y de las proyecciones nacionales y por entidad 2010-2050, realizadas con los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, así como de los censos de 1990 y 2000 y de los Conteos de Población de 1995 y 2005. Las y los lectores podrán identificar los cambios en esta Razón a partir de la modificación del denominador. De esta manera, si se estima la RMM con las proyecciones de nacidos vivos del CONAPO que se han utilizado para dar seguimiento a la MM desde el periodo 1990-2010, podemos reconocer que la RMM con el número de nacidos vivos estimados fue de 50.7 y con las proyecciones actuales esta RMM es de 43.2. Para tener una serie comparable se tendrá que reestimar toda la serie completa, de otro modo se puede tener una falsa impresión de que se ha obtenido una caída importante de las muertes. Por ello, en esta publicación hemos decidido incluir ambas mediciones a fin de que las y los lectores puedan realizar comparaciones con las Numeralias 2009 y 2010 publicadas por el OMM.

Para la mejor comprensión de la dimensión del problema de la MM en cada entidad federativa se ha incluido su RMM, que servirá para reconocer cuáles son las entidades que están enfrentando de mejor manera esta situación. El lector podrá comparar estos datos con las Numeralias 2009 y 2010.

En la Numeralia 2011, además de seguir incluyendo la adscripción étnica de las fallecidas a través del identificador conocido como “Hablante de lengua indígena”, se incorpora información relativa a los antecedentes de atención materna de las fallecidas, datos que no se encuentran disponibles en la base de mortalidad publicada por el INEGI y solamente se localizan en la base que elabora la DGIS. Se incorporan nuevamente otras variables de interés: lugar de ocurrencia de la muerte, condición de aseguramiento de la fallecida y causa de muerte relacionada con el aborto, aun cuando ésta no es parte de las principales causas de muerte materna de los estados. Todo esto permitirá al Observatorio dar seguimiento al número de muertes por institución.

Graciela Freyermuth y Marisol Luna
Marzo, 2013

- * La categoría “Servicios federales o estatales de salud” incluye: SSA, IMSS-Oportunidades y Otra unidad pública.
- * La categoría “Servicios de salud de instituciones de seguridad social” incluye: IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR.
- * La categoría “Por causas obstétricas indirectas” incluye los Códigos de clasificación CIE-10: B20-B24 más embarazo, F53, M830 y O98-O99.
- * La categoría “Enfermedades hipertensivas del embarazo” incluye los Códigos de clasificación CIE-10: O10-O16.
- * La categoría “Otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto” incluye los Códigos de clasificación CIE-10: O21, O23-O43, O47-O66, O68-O71 y O73-O84.
- * Para las categorías: hablante de lengua indígena, estado civil, escolaridad, afiliación, atención médica y sitio de atención del parto, los valores etiquetados como “Se ignora” se recodificaron a “No especificado” para simplificar el análisis.

Los porcentajes pueden no sumar 100% por efectos de redondeo en los decimales.

Fuente:

INEGI, DGIS/SSA, 2011, Bases de datos de defunciones, México.

Por residencia habitual de la mujer

Nacional:

971 muertes en 2011

RMM: 43.2*

RMM: 50.7**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 9.6** era menor de 19 años
- 82.5** vivía en unión libre o era casada
- 16.0** era hablante de lengua indígena
- 82.3** se dedicaba al hogar
 - 7.5** no tenía escolaridad
 - 31.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 20.0** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 48.1** contaba con Seguro Popular
- 54.6** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 17.4** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
 - 12.7** en su casa
 - 2.8** en la vía pública
- 86.8** contó con asistencia médica
- 96.6** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 24.7** murió por causas obstétricas indirectas
- 24.4** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 23.1** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 7.6** por aborto
- 12.1** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 43.8** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 31.3** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 67.8** recibió atención de un médico durante el parto
- 46.6** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 12.4** en su casa

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



Aguascalientes:

5 muertes en 2011

RMM: 18.9*

RMM: 22.3**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 40.0** era menor de 19 años
- 60.0** vivía en unión libre o era casada
- 100.0** se dedicaba al hogar
- 80.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 20.0** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 80.0** contaba con Seguro Popular
- 80.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 20.0** en su casa
- 100.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 40.0** murió por causas obstétricas indirectas
- 20.0** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 20.0** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 20.0** por complicaciones venosas en el embarazo, parto y puerperio
- 20.0** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 60.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 60.0** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 80.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 80.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



Baja California:

21 muertes en 2011

RMM: 36.9*

RMM: 36.9**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 23.8** era menor de 19 años
- 76.2** vivía en unión libre o era casada
- 4.8** era hablante de lengua indígena
- 66.7** se dedicaba al hogar
- 4.8** contaba con primaria incompleta o completa
- 42.9** tenía secundaria incompleta o completa
- 14.3** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 28.6** contaba con Seguro Popular
- 47.6** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 42.9** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 4.8** en su casa
- 95.2** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 57.1** murió por causas obstétricas indirectas
- 14.3** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 14.3** por aborto
- 4.8** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 42.9** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 19.1** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 57.1** recibió atención de un médico durante el parto
- 38.1** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 4.8** en su casa

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



Baja California Sur:

4 muertes en 2011

RMM: 34.4*

RMM: 40.8**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 25.0** era menor de 19 años
- 100.0** vivía en unión libre o era casada
- 100.0** se dedicaba al hogar
- 50.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 50.0** contaba con Seguro Popular
- 50.0** contaba con seguro de salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR
- 50.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 25.0** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 25.0** en su casa
- 75.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 50.0** murió por causas obstétricas indirectas
- 25.0** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 25.0** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 50.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 50.0** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 100.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 75.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



10 muertes en 2011

RMM: 61.4*

RMM: 68.9**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 40.0** tenía entre 19 y 24 años
- 70.0** vivía en unión libre o era casada
- 10.0** era hablante de lengua indígena
- 90.0** se dedicaba al hogar
- 70.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 10.0** contaba con secundaria incompleta o completa
- 10.0** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 70.0** contaba con Seguro Popular
- 70.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 10.0** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 10.0** en otro lugar
- 70.0** contó con asistencia médica
- 80.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 40.0** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 30.0** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 20.0** por causas obstétricas indirectas
- 50.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 40.0** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 70.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 60.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



22 muertes en 2011

RMM: 40.7*

RMM: 47.7**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 4.5** era menor de 19 años
- 90.9** vivía en unión libre o era casada
- 63.6** se dedicaba al hogar
- 22.7** contaba con primaria incompleta o completa
- 31.8** contaba con secundaria incompleta o completa
- 18.2** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 9.1** contaba con Seguro Popular
- 36.4** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 54.6** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 4.6** en su casa
- 95.5** contó con asistencia médica
- 95.5** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 54.5** murió por causas obstétricas indirectas
- 27.3** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 9.1** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 4.5** por aborto
- 9.1** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 22.7** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 13.6** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 63.6** recibió atención de un médico durante el parto
- 27.3** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



5 muertes en 2011

RMM: 37.9*

RMM: 49.3**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

0%

20.0 era menor de 19 años

100.0 vivía en unión libre o era casada

60.0 se dedicaba al hogar

20.0 contaba con primaria incompleta o completa

40.0 contaba con secundaria incompleta o completa

60.0 contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

40.0 contaba con Seguro Popular

20.0 murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

60.0 en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

20.0 en otro lugar

100.0 contó con asistencia médica

100.0 de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

60.0 murió por causas obstétricas indirectas

20.0 por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

20.0 por sepsis y otras infecciones

60.0 inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

40.0 tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

80.0 recibió atención de un médico durante el parto

20.0 atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



60 muertes en 2011

RMM: 52.6*

RMM: 63.8**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 6.7** era menor de 19 años
- 88.3** vivía en unión libre o era casada
- 50.0** era hablante de lengua indígena
- 93.3** se dedicaba al hogar
- 18.3** no tenía escolaridad
- 45.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 25.0** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 58.3** contaba con Seguro Popular
- 66.7** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 8.3** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 16.7** en su casa
- 81.7** contó con asistencia médica
- 88.3** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 20.0** murió por causas obstétricas indirectas
- 30.0** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 33.3** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 6.7** por aborto
- 25.0** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 33.3** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 20.0** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 53.3** recibió atención de un médico durante el parto
- 23.3** fue atendida por una partera
- 43.3** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 31.7** en su casa

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



46 muertes en 2011

RMM: 67.2*

RMM: 79.3**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 15.2** era menor de 19 años
- 76.1** vivía en unión libre o era casada
- 21.7** era hablante de lengua indígena
- 80.4** se dedicaba al hogar
- 19.6** no tenía escolaridad
- 21.7** contaba con primaria incompleta o completa
- 15.2** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 47.8** contaba con Seguro Popular
- 41.3** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 17.4** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 15.2** en su casa
- 78.3** contó con asistencia médica
- 91.3** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 23.9** murió por causas obstétricas indirectas
- 30.4** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 23.9** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 6.5** por aborto
- 23.9** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 37.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 17.4** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 65.2** recibió atención de un médico durante el parto
- 41.3** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 10.9** en su casa

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



Distrito Federal:

56 muertes en 2011

RMM: 41.3*

RMM: 43.7**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

3.6	era menor de 19 años
78.6	vivía en unión libre o era casada
3.6	era hablante de lengua indígena
64.3	se dedicaba al hogar
3.6	no tenía escolaridad
12.5	contaba con primaria incompleta o completa
32.1	no tenía seguridad social ni protección a la salud
33.9	contaba con Seguro Popular
57.2	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
25.0	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
7.1	en su casa
98.2	contó con asistencia médica
100.0	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
23.2	murió por causas obstétricas indirectas
21.4	por enfermedades hipertensivas del embarazo
25.0	por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
8.9	por aborto
3.6	no tuvo control prenatal durante el embarazo
46.4	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
37.5	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
82.1	recibió atención de un médico durante el parto
60.7	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



13 muertes en 2011

RMM: 38.5*

RMM: 46.2**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 7.7** tenía entre 19 y 24 años
- 84.6** vivía en unión libre o era casada
- 15.4** era hablante de lengua indígena
- 61.5** se dedicaba al hogar
- 30.8** no tenía escolaridad
- 15.4** contaba con primaria incompleta o completa
- 7.7** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 46.2** contaba con Seguro Popular
- 61.5** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 15.4** en otro lugar
- 7.7** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 7.7** en la vía pública
- 76.9** contó con asistencia médica
- 76.9** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 7.7** murió por causas obstétricas indirectas
- 15.4** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 53.8** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 7.7** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 7.7** por aborto
- 15.4** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 30.8** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 30.8** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 46.2** recibió atención de un médico durante el parto
- 23.1** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 23.1** en su casa

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



Estado de México:

127 muertes en 2011

RMM: 41.5*

RMM: 48.8**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 7.1** era menor de 19 años
- 79.5** vivía en unión libre o era casada
- 3.2** era hablante de lengua indígena
- 76.4** se dedicaba al hogar
- 4.7** no tenía escolaridad
- 22.8** contaba con primaria incompleta o completa
- 28.4** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 46.5** contaba con Seguro Popular
- 70.1** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 13.4** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 8.7** en una unidad médica privada
- 5.5** en su casa
- 95.3** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 19.7** murió por causas obstétricas indirectas
- 29.9** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 13.4** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 11.8** por aborto
- 8.7** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 44.1** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 34.7** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 78.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 56.7** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



42 muertes en 2011

RMM: 36.5*

RMM: 43.6**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 4.8** era menor de 19 años
- 95.2** vivía en unión libre o era casada
- 90.5** se dedicaba al hogar
- 52.4** contaba con primaria incompleta o completa
- 26.2** contaba con secundaria incompleta o completa
- 11.9** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 59.5** contaba con Seguro Popular
- 64.3** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 16.7** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 4.8** en su casa
- 97.6** contó con asistencia médica
- 97.6** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 16.7** murió por causas obstétricas indirectas
- 35.7** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 21.4** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 16.7** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 4.8** por aborto
- 11.9** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 64.3** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 38.1** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 88.1** recibió atención de un médico durante el parto
- 64.3** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



69 muertes en 2011

RMM: 91.4*

RMM: 113.0**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 7.2** era menor de 19 años
- 84.1** vivía en unión libre o era casada
- 40.6** era hablante de lengua indígena
- 94.2** se dedicaba al hogar
- 18.8** no tenía escolaridad
- 42.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 29.0** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 55.1** contaba con Seguro Popular

- 39.1** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 33.3** en su casa
- 11.6** en la vía pública

- 56.5** contó con asistencia médica
- 97.1** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

- 17.4** murió por causas obstétricas indirectas
- 18.8** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 44.9** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 4.3** por aborto

- 15.9** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 37.7** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 37.7** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

- 36.2** recibió atención de un médico durante el parto
- 30.4** por una partera
- 31.9** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 47.8** en su casa

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



Hidalgo:

16 muertes en 2011

RMM: 28.8*

RMM: 36.5**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 6.3** era menor de 19 años
- 81.3** vivía en unión libre o era casada
- 43.8** era hablante de lengua indígena
- 81.3** se dedicaba al hogar
- 6.3** no tenía escolaridad
- 31.3** contaba con primaria incompleta o completa
- 18.8** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 43.8** contaba con Seguro Popular
- 56.3** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 25.0** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 12.5** en su casa
- 100.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 25.0** murió por causas obstétricas indirectas
- 25.0** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 43.8** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 18.8** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 37.5** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 31.3** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 75.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 43.8** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 12.5** en su casa

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



36 muertes en 2011

RMM: 24.2*

RMM: 28.7**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 11.1** era menor de 19 años
- 80.6** vivía en unión libre o era casada
- 5.6** era hablante de lengua indígena
- 86.1** se dedicaba al hogar
- 2.8** no tenía escolaridad
- 25.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 2.8** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 61.1** contaba con Seguro Popular
- 63.9** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 16.7** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 11.1** en su casa
- 88.9** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 41.7** murió por causas obstétricas indirectas
- 19.4** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 16.7** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 5.6** por aborto
- 16.7** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 38.9** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 13.9** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 80.6** recibió atención de un médico durante el parto
- 58.3** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



53 muertes en 2011

RMM: 58.5*

RMM: 74.7**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 1.9** era menor de 19 años
- 94.3** vivía en unión libre o era casada
- 9.4** era hablante de lengua indígena
- 88.7** se dedicaba al hogar
- 5.7** no tenía escolaridad
- 49.1** contaba con primaria incompleta o completa
- 22.6** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 58.6** contaba con Seguro Popular
- 58.5** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 15.1** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 18.9** en una unidad médica privada
- 7.6** en su casa
- 94.3** contó con asistencia médica
- 98.1** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 28.3** murió por causas obstétricas indirectas
- 20.8** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 22.6** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 11.3** por aborto
- 9.4** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 43.4** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 22.6** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 75.5** recibió atención de un médico durante el parto
- 51.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



13 muertes en 2011

RMM: 37.9*

RMM: 46.1**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 30.8** era menor de 19 años
- 76.9** vivía en unión libre o era casada
- 84.6** se dedicaba al hogar
- 38.5** contaba con primaria incompleta o completa
- 46.2** contaba con secundaria incompleta o completa
- 15.4** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 84.6** contaba con Seguro Popular
- 92.3** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 7.7** en su casa
- 100.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 30.8** murió por causas obstétricas indirectas
- 46.2** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 15.4** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 7.7** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 84.6** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 53.9** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 76.9** recibió atención de un médico durante el parto
- 61.5** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



10 muertes en 2011

RMM: 46.7*

RMM: 60.8**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

30.0	era menor de 19 años
60.0	vivía en unión libre o era casada
60.0	era hablante de lengua indígena
90.0	se dedicaba al hogar
30.0	no tenía escolaridad
30.0	contaba con primaria incompleta o completa
50.0	no tenía seguridad social ni protección a la salud
30.0	contaba con Seguro Popular
10.0	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
10.0	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
50.0	en su casa
20.0	en otro lugar
50.0	contó con asistencia médica
90.0	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
10.0	por enfermedades hipertensivas del embarazo
20.0	por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
50.0	por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
10.0	por aborto
10.0	no tuvo control prenatal durante el embarazo
10.0	inició el cuidado prenatal en el séptimo mes del embarazo
20.0	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
10.0	recibió atención de un médico durante el parto
10.0	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
30.0	por una partera
60.0	en su casa

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



25 muertes en 2011

RMM: 29.4*

RMM: 33.3**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 12.0** tenía entre 19 y 24 años
- 76.0** vivía en unión libre o era casada
- 4.0** era hablante de lengua indígena
- 80.0** se dedicaba al hogar
- 4.0** no tenía escolaridad
- 16.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 12.0** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 28.0** contaba con Seguro Popular
- 56.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 24.0** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 12.0** en una unidad médica privada
- 4.0** en su casa
- 92.0** contó con asistencia médica
- 96.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 28.0** murió por causas obstétricas indirectas
- 36.0** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 16.0** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 12.0** por aborto
- 8.0** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 52.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 36.0** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 84.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 60.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



50 muertes en 2011

RMM: 60.8*

RMM: 75.8**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 12.0** era menor de 19 años
- 92.0** vivía en unión libre o era casada
- 54.0** era hablante de lengua indígena
- 94.0** se dedicaba al hogar
- 16.0** no tenía escolaridad
- 44.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 34.0** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 42.0** contaba con Seguro Popular
- 46.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 12.0** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 30.0** en su casa
- 76.0** contó con asistencia médica
- 96.0** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 12.0** murió por causas obstétricas indirectas
- 44.0** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 12.0** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 8.0** por aborto
- 18.0** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 38.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 32.0** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 40.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 24.0** por una partera
- 30.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 34.0** en su casa

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



59 muertes en 2011

RMM: 45.8*

RMM: 53.7**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

8.5	era menor de 19 años
81.4	vivía en unión libre o era casada
15.3	era hablante de lengua indígena
76.3	se dedicaba al hogar
5.1	no tenía escolaridad
33.9	contaba con primaria incompleta o completa
18.6	no tenía seguridad social ni protección a la salud
49.2	contaba con Seguro Popular
47.5	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
15.3	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
15.3	en su casa
84.8	contó con asistencia médica
94.9	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
33.9	murió por causas obstétricas indirectas
22.0	por enfermedades hipertensivas del embarazo
18.6	por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
6.8	por aborto
10.2	no tuvo control prenatal durante el embarazo
50.9	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
40.7	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
59.3	recibió atención de un médico durante el parto
42.4	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
13.6	por una partera
23.7	en su casa

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



16 muertes en 2011

RMM: 42.6*

RMM: 49.1**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

18.8	era menor de 19 años
62.5	vivía en unión libre o era casada
75.0	se dedicaba al hogar
43.8	contaba con primaria incompleta o completa
37.5	contaba con secundaria incompleta o completa
18.8	no tenía seguridad social ni protección a la salud
37.5	contaba con Seguro Popular
56.3	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
31.3	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
6.3	en la vía pública
93.8	contó con asistencia médica
100.0	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
25.0	murió por causas obstétricas indirectas
25.0	por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
18.8	por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
12.5	por aborto
12.5	no tuvo control prenatal durante el embarazo
68.8	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
12.5	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
81.3	recibió atención de un médico durante el parto
25.0	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



13 muertes en 2011

RMM: 48.2*

RMM: 47.5**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

7.7	era menor de 19 años
100.0	vivía en unión libre o era casada
23.1	era hablante de lengua indígena
76.9	se dedicaba al hogar
23.1	contaba con primaria incompleta o completa
53.9	contaba con secundaria incompleta o completa
23.1	contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR
61.5	contaba con Seguro Popular
53.9	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
30.8	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
7.7	en su casa
92.3	contó con asistencia médica
100.0	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
30.8	murió por causas obstétricas indirectas
30.8	por enfermedades hipertensivas del embarazo
30.8	por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
23.1	no tuvo control prenatal durante el embarazo
46.2	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
38.5	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
69.2	recibió atención de un médico durante el parto
69.2	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



24 muertes en 2011

RMM: 44.5*

RMM: 51.8**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 20.8** tenía entre 19 y 24 años
- 91.7** vivía en unión libre o era casada
- 16.7** era hablante de lengua indígena
- 91.7** se dedicaba al hogar
- 25.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 45.8** contaba con secundaria incompleta o completa
- 4.2** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 33.3** contaba con Seguro Popular
- 37.5** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 29.2** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 12.5** en una unidad médica privada
- 4.2** en su casa
- 91.7** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 16.7** murió por causas obstétricas indirectas
- 25.0** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 25.0** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 8.3** por aborto
- 8.3** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 50.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 29.2** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 79.2** recibió atención de un médico durante el parto
- 37.5** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



9 muertes en 2011

RMM: 16.4*

RMM: 20.5**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 33.3** era menor de 19 años
- 88.9** vivía en unión libre o era casada
- 88.9** se dedicaba al hogar
- 44.4** contaba con primaria incompleta o completa
- 33.3** contaba con secundaria incompleta o completa
- 11.1** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 66.7** contaba con Seguro Popular
- 77.8** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 22.2** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 100.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 22.2** murió por causas obstétricas indirectas
- 33.3** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 44.4** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 11.1** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 22.2** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 22.2** tuvo más de cinco consultas prenatales
- 88.9** recibió atención de un médico durante el parto
- 66.7** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



22 muertes en 2011

RMM: 42.1*

RMM: 51.4**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

27.3	tenía entre 19 y 24 años
77.3	vivía en unión libre o era casada
90.9	se dedicaba al hogar
4.6	no tenía escolaridad
13.6	contaba con primaria incompleta o completa
9.1	no tenía seguridad social ni protección a la salud
50.0	contaba con Seguro Popular
59.1	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
18.2	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
9.1	en su casa
86.4	contó con asistencia médica
100.0	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
18.2	murió por causas obstétricas indirectas
27.3	por enfermedades hipertensivas del embarazo
22.7	por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
18.2	por complicaciones, principalmente del embarazo y parto
4.5	por aborto
9.1	no tuvo control prenatal durante el embarazo
50.0	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
31.8	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
72.7	recibió atención de un médico durante el parto
45.5	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



21 muertes en 2011

RMM: 44.8*

RMM: 55.8**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 33.3** tenía entre 19 y 24 años
- 76.2** vivía en unión libre o era casada
- 76.2** se dedicaba al hogar
- 19.1** contaba con primaria incompleta o completa
- 38.1** contaba con secundaria incompleta o completa
- 19.1** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 38.1** contaba con Seguro Popular
- 57.1** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 14.3** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
 - 9.5** en una unidad médica privada
 - 9.5** en su casa
- 90.5** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 14.3** murió por causas obstétricas indirectas
 - 14.3** por enfermedades hipertensivas del embarazo
 - 19.0** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
 - 23.8** por otras complicaciones, principalmente puerperales
 - 14.3** por aborto
- 23.8** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 28.6** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 33.3** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 81.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 38.1** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



Tamaulipas:

10 muertes en 2011

RMM: 16.0*

RMM: 18.1**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 10.0** tenía entre 19 y 24 años
- 90.0** vivía en unión libre o era casada
- 60.0** se dedicaba al hogar
- 30.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 60.0** contaba con secundaria incompleta o completa
- 10.0** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 40.0** contaba con Seguro Popular

- 50.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 10.0** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 20.0** en una unidad médica privada
- 10.0** en su casa

- 90.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

- 30.0** murió por causas obstétricas indirectas
- 30.0** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 20.0** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 10.0** por aborto

- 10.0** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 70.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 40.0** tuvo más de cinco consultas prenatales

- 80.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 50.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



7 muertes en 2011

RMM: 27.7*

RMM: 32.0**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

28.6	era menor de 19 años
85.7	vivía en unión libre o era casada
85.7	se dedicaba al hogar
42.9	contaba con primaria incompleta o completa
42.9	contaba con secundaria incompleta o completa
28.6	no tenía seguridad social ni protección a la salud
14.3	contaba con Seguro Popular
42.9	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
14.3	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
28.6	en una unidad médica privada
14.3	en su casa
85.7	contó con asistencia médica
100.0	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
14.3	murió por causas obstétricas indirectas
28.6	por enfermedades hipertensivas del embarazo
28.6	por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
14.3	por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
14.3	no tuvo control prenatal durante el embarazo
42.9	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
14.3	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
85.7	recibió atención de un médico durante el parto
42.9	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



81 muertes en 2011

RMM: 57.0*

RMM: 64.2**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 12.3** era menor de 19 años
- 72.8** vivía en unión libre o era casada
- 13.6** era hablante de lengua indígena
- 85.2** se dedicaba al hogar
- 8.6** no tenía escolaridad
- 24.7** contaba con primaria incompleta o completa
- 16.1** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 53.1** contaba con Seguro Popular
- 43.2** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 17.3** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 18.5** en su casa
- 84.0** contó con asistencia médica
- 95.1** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 27.2** murió por causas obstétricas indirectas
- 27.2** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 19.8** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 7.4** por aborto
- 7.4** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 45.7** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 43.2** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 63.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 43.2** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 11.1** por una partera
- 11.1** en su casa

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



14 muertes en 2011

RMM: 35.6*

RMM: 41.5**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 21.4** era menor de 19 años
- 78.6** vivía en unión libre o era casada
- 7.1** era hablante de lengua indígena
- 85.7** se dedicaba al hogar
- 28.6** contaba con primaria incompleta o completa
- 42.9** contaba con secundaria incompleta o completa
- 42.9** contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR
- 50.0** contaba con Seguro Popular
- 50.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 42.9** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 7.1** en su casa
- 92.9** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 42.9** murió por causas obstétricas indirectas
- 21.4** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 21.4** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 7.1** por aborto
- 14.3** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 14.3** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 85.7** recibió atención de un médico durante el parto
- 42.9** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



12 muertes en 2011

RMM: 38.3*

RMM: 48.3**

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 8.3** tenía entre 19 y 24 años
- 100.0** vivía en unión libre o era casada
- 8.3** era hablante de lengua indígena
- 75.0** se dedicaba al hogar
- 33.3** contaba con primaria incompleta o completa
- 41.7** contaba con secundaria incompleta o completa
- 16.7** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 58.3** contaba con Seguro Popular

- 66.7** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 8.3** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 16.7** en una unidad médica privada
- 8.3** en su casa

- 100.0** contó con asistencia médica
- 91.7** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

- 16.7** murió por causas obstétricas indirectas
- 16.7** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 41.7** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 8.3** por aborto

- 66.7** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 66.7** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

- 91.7** recibió atención de un médico durante el parto
- 58.3** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

** Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.



Por tipo de afiliación en salud

No afiliadas a algún servicio de salud: 194 muertes en 2011

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 34.5** murió en el Estado de México, el Distrito Federal y Veracruz
- 11.3** era menor de 19 años
- 24.7** era hablante de lengua indígena
- 80.9** vivía en unión libre o era casada
- 87.6** se dedicaba al hogar
- 11.3** no tenía escolaridad
- 30.4** contaba sólo con primaria incompleta o completa
- 53.6** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 22.2** en su casa
- 13.9** en una unidad médica privada
- 77.3** contó con asistencia médica
- 94.3** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 25.8** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 23.7** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 18.6** por causas obstétricas indirectas
- 10.3** por aborto
- 16.0** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 30.9** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 33.5** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 53.6** recibió atención de un médico durante el parto
- 10.8** por una partera
- 39.7** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

172 muertes en 2011

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 32.0** murió en el Estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León y Veracruz
- 5.2** era menor de 19 años
- 0.6** era hablante de lengua indígena
- 80.8** vivía en unión libre o era casada
- 57.6** se dedicaba al hogar
- 1.2** no tenía escolaridad
- 16.3** contaba sólo con primaria incompleta o completa
- 73.8** murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 13.4** en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 7.0** en su casa
- 95.9** contó con asistencia médica
- 98.8** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 38.4** murió por causas obstétricas indirectas
- 20.3** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 13.4** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 8.1** por aborto
- 7.6** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 48.8** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 22.1** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 75.6** recibió atención de un médico durante el parto
- 65.7** atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

21 muertes en 2011

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

0%

- 19.0** murió en el Estado de México y el Distrito Federal
- 4.8** era menor de 19 años
- 9.5** era hablante de lengua indígena
- 90.5** vivía en unión libre o era casada
- 33.3** se dedicaba al hogar
- 4.8** contaba sólo con primaria incompleta o completa
- 19.0** tenía secundaria incompleta o completa
- 71.4** murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 14.3** en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 9.5** en una unidad médica privada
- 100.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 38.1** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 28.6** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 14.3** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 9.5** por aborto
- 19.1** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 57.1** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 19.0** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 90.5** recibió atención de un médico durante el parto
- 61.9** atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

467 muertes en 2011

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 34.0** murió en el Estado de México, Guerrero, Puebla, Michoacán y Chiapas
- 11.6** era menor de 19 años
- 15.6** era hablante de lengua indígena
- 83.7** vivía en unión libre o era casada
- 92.5** se dedicaba al hogar
 - 7.7** no tenía escolaridad
- 39.2** contaba sólo con primaria incompleta o completa
- 74.5** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
 - 4.1** en una unidad médica privada
 - 12.2** en su casa
- 88.7** contó con asistencia médica
- 98.1** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 24.0** murió por causas obstétricas indirectas
- 27.6** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 23.3** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
 - 6.6** por aborto
- 11.1** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 45.2** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 32.3** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 72.2** recibió atención de un médico durante el parto
 - 7.7** fue una partera
- 66.6** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

Afiliadas a PEMEX, SEDENA o SEMAR:

9 muertes en 2011

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 44.4** murió en Veracruz
- 33.3** tenía entre 19 y 24 años
- 0.0** era hablante de lengua indígena
- 88.9** vivía en unión libre o era casada
- 77.8** se dedicaba al hogar
- 22.2** contaba sólo con secundaria incompleta o completa
- 33.3** tenía preparatoria o bachillerato
- 88.9** murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 11.1** en la vía pública
- 88.9** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 33.3** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 33.3** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 22.2** por causas obstétricas indirectas
- 55.6** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 66.7** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 66.7** recibió atención de un médico durante el parto
- 11.1** por una partera
- 77.8** atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

Afiliadas a otra institución de salud:

23 muertes en 2011

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 21.7** murió en el Estado de México, Puebla y Coahuila
- 8.7** era menor de 19 años
- 30.4** era hablante de lengua indígena
- 87.0** vivía en unión libre o era casada
- 73.9** se dedicaba al hogar
- 8.7** no tenía escolaridad
- 26.1** contaba sólo con primaria incompleta o completa
- 47.8** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 17.4** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 13.0** en una unidad médica privada

- 91.3** contó con asistencia médica
- 91.3** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

- 21.7.** murió por causas obstétricas indirectas
- 34.8** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 17.4** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 8.7** por aborto

- 8.7** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 65.2** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 56.5** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

- 69.6** recibió atención de un médico durante el parto
- 34.8** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

Por lugar de ocurrencia de la defunción

530 muertes en 2011

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 37.0** murió en el Estado de México, Chiapas, Veracruz y el Distrito Federal
- 10.2** era menor de 19 años
- 12.1** era hablante de lengua indígena
- 82.6** vivía en unión libre o era casada
- 87.5** se dedicaba al hogar
 - 5.5** no tenía escolaridad
 - 33.8** contaba sólo con primaria incompleta o completa
- 19.6** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 65.7** contaba con Seguro Popular
- 97.4** contó con asistencia médica
- 97.7** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 19.4** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 27.7** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 24.3** por causas obstétricas indirectas
 - 8.3** por aborto
- 13.2** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 44.7** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 34.2** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 79.2** recibió atención de un médico durante el parto
- 74.5** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

Servicios de salud de las instituciones de seguridad social:

169 muertes en 2011

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

33.7 murió en el Estado de México, Veracruz, el Distrito Federal y Coahuila

6.5 era menor de 19 años

7.1 era hablante de lengua indígena

82.8 vivía en unión libre o era casada

58.6 se dedicaba al hogar

4.1 no tenía escolaridad

17.8 contaba sólo con primaria incompleta o completa

3.0 no tenía seguridad social ni protección a la salud

75.1 era derechohabiente del IMSS

3.6 contaba con Seguro Popular

99.4 contó con asistencia médica

99.4 de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

34.3 murió por causas obstétricas indirectas

25.4 por enfermedades hipertensivas del embarazo

16.0 por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

6.5 por aborto

7.7 no tuvo control prenatal durante el embarazo

49.1 inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

26.0 tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

80.5 recibió atención de un médico durante el parto

77.5 atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

68 muertes en 2011

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 30.9** murió en el Estado de México y Michoacán
- 7.4** era menor de 19 años
- 5.9** era hablante de lengua indígena
- 88.2** vivía en unión libre o era casada
- 82.4** se dedicaba al hogar
- 2.9** no tenía escolaridad
- 26.5** contaba sólo con primaria incompleta o completa
- 39.7** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 27.9** contaba con Seguro Popular
- 95.6** contó con asistencia médica
- 98.5** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 19.1** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 16.2** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 23.5** por causas obstétricas indirectas
- 10.3** por aborto
- 7.4** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 48.5** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 20.6** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 75.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 63.2** atendió el parto en una clínica u hospital privado

123 muertes en 2011

De las mujeres que fallecieron por muerte materna

%

- 43.1** murió en Guerrero, Veracruz y Oaxaca
- 10.6** era menor de 19 años
- 35.0** era hablante de lengua indígena
- 82.9** vivía en unión libre o era casada
- 93.5** se dedicaba al hogar
- 18.7** no tenía escolaridad
- 35.0** contaba sólo con primaria incompleta o completa
- 35.0** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 46.3** contaba con Seguro Popular
- 39.0** contó con asistencia médica
- 91.1** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 39.8** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 21.1** por causas obstétricas indirectas
- 17.9** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 4.1** por aborto
- 14.6** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 34.1** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 28.5** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 20.3** recibió atención de un médico durante el parto
- 26.8** por una partera
- 15.4** atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 54.5** en su casa

Para mayor información consulta nuestra página:
www.omm.org.mx

o escríbenos a:
observatoriomuertematerna@gmail.com

y síguenos en twitter:
[@observatoriommm](https://twitter.com/observatoriommm)

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
Casa Chata: Hidalgo y Matamoros s/n, Col. Tlalpan, Deleg. Tlalpan, México,
D.F., C.P. 14000
Teléfono provisional: (01 55) 5487 7100 ext. 1606

Observatorio de Mortalidad Materna en México

Numeralia 2011. Mortalidad Materna en México

Freyermuth, Graciela, Luna, Marisol, Muños, José Alberto, 2013, Numeralia 2011, Mortalidad Materna en México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Fundación MacArthur en México, Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), México, pp. 49.

Esta publicación contó con el apoyo financiero del CIESAS, la Fundación MacArthur en México y el OMM, 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos definitiva de mortalidad materna, Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud, México, 2012.

Validación: José Alberto Muños

Diseño: Ana Laura García

Corrección de estilo: Laura E. Martínez B.

www.omm.org.mx

observatoriomuertematerna@gmail.com

[@observatoriommm](#)