



# Numeralia 2012

## Mortalidad Materna en México





# Contenido

<b>Presentación</b>	<b>3</b>
<b>Notas técnicas</b>	<b>5</b>
<b>Por residencia habitual de la mujer</b>	<b>7</b>
<b>Por tipo de afiliación en salud</b>	<b>43</b>
<b>Por lugar de ocurrencia de la defunción</b>	<b>51</b>
<b>Muertes maternas tardías</b>	<b>57</b>



# Presentación

El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) tiene entre sus mandatos, crear un sistema de indicadores que facilite el análisis, evaluación, monitoreo y vigilancia sistemática de procesos y resultados de políticas, estrategias, programas y servicios encaminados a reducir la mortalidad materna (MM), así como contar con los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a información confiable, oportuna y periódica que haga posible su uso para el análisis y prevención de las muertes maternas en México. La publicación que se ha hecho año con año, desde 2010, de la Numeralia y de los Indicadores obedece a dicho mandato.

La Numeralia 2012 brinda una mirada rápida a la información más relevante de las defunciones maternas ocurridas y registradas durante 2012 en México, con el objetivo de resaltar aquellos aspectos particulares en el comportamiento de la MM de acuerdo con la entidad de residencia habitual de la mujer, su condición de aseguramiento en salud y lugar de ocurrencia de la defunción. Por ello no pretende que el o la lectora tenga una visión comparable por entidad federativa, por condición de aseguramiento en salud o por lugar de defunción, sin embargo, la información comparada podrá ser consultada en la publicación de los Indicadores 2012.

La Numeralia de Mortalidad Materna en México para el año 2012 se elaboró a partir de información obtenida de la base de datos de MM de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud (SSA), que año con año es publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) después de ser validada. Se han incluido en esta sistematización los porcentajes de datos sociodemográficos y de acceso a servicios de salud que se consideran de mayor relevancia, para que quienes estén interesados en esta problemática tengan acceso a información desagregada para cada entidad federativa de la República Mexicana; asimismo, se ha incorporado la Razón de Mortalidad Materna (RMM), definida como el número de defunciones de mujeres mientras se encuentren embarazadas o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo y debida a cualquier causa relacionada con, o agravada por, el embarazo mismo o su atención (con exclusión de las muertes accidentales o incidentales), en un determinado año y por cada 100 mil nacidos vivos.

Al igual que en la Numeralia del año anterior, se incluyen dos estimaciones de la RMM a partir de las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y una más del nuevo denominador utilizado por la DGIS para la estimación oficial. La primera utiliza como denominador las estimaciones anteriores presentadas por el CONAPO con base en las proyecciones de la población de México 2005-2030.

En la segunda estimación se utilizaron las nuevas estimaciones del CONAPO, que se publicaron en 2012, obtenidas a partir de la conciliación demográfica 1990-2010 y de las proyecciones nacionales y por entidad 2010-2050, realizadas con los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, así como de los Censos de 1990 y 2000 y de los Conteos de Población de 1995 y 2005. En la tercera se incluyeron como denominador los nacimientos registrados a partir de los certificados de nacimiento con corrección del subregistro en nueve entidades federativas: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Las y los lectores podrán identificar los cambios en esta Razón a partir de la modificación del denominador. De esta manera, si se estima la RMM con las proyecciones de nacidos vivos del CONAPO que se han utilizado para dar seguimiento a la MM desde el periodo 1990-2010, podemos reconocer que la RMM con el número de nacidos vivos estimados fue de 50.5 y, con las proyecciones actuales, esta RMM es de 42.7; mientras que si se utiliza la información de los certificados de nacimiento la estimación de la RMM es de 42.3. De la misma manera, si medimos el avance de este indicador tomando en cuenta estas tres mediciones, éste es diferente dependiendo del indicador: así, para la estimación de nacidos vivos del CONAPO 2005 el avance de 1990 a 2012 ha sido de 43%, si se toma como referencia CONAPO 2010 este avance se incrementa en casi diez puntos porcentuales (51.8%) y con los nacidos registrados por el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) del Sistema Nacional de Infor-

mación en Salud en México (SINAIS) de la SSA, es de 52%. Hay que recordar que se espera un decremento de 75% para 2015.

Para la mejor comprensión de la dimensión del problema de la MM en cada entidad federativa se ha incluido su RMM, que servirá para reconocer cuáles son las entidades que están enfrentando de mejor manera esta situación. El lector podrá comparar estos datos con las Numeralias 2009, 2010 y 2011.

En la Numeralia 2012, además de seguir incluyendo la adscripción étnica de las fallecidas a través del identificador conocido como “Hablante de lengua indígena”, se incorpora información relativa a los antecedentes de atención materna de las fallecidas, datos que no se encuentran disponibles en la base de mortalidad publicada por el INEGI y solamente se localizan en la base que elabora la DGIS. Se integran nuevamente otras variables de interés: lugar de ocurrencia de la muerte, condición de aseguramiento de la fallecida y causa de muerte relacionada con el aborto, aun cuando ésta no es parte de las principales causas de muerte materna de los estados. Todo esto permitirá al Observatorio dar seguimiento al número de muertes por institución.

El total de muertes maternas para 2012 fue de 1 073. Sin embargo, el número de muertes maternas incluido en la Numeralia por lugar de residencia, derechohabiencia y lugar de ocurrencia de la defunción es el que se considera oficialmente para estimar la RMM (960 MM), por lo que no están contabilizadas las que fueron resultado del coriocarcinoma ni las que ocurrieron después de 42 días del parto, es decir, las denominadas tardías. En esta Numeralia se incluyen los datos más relevantes de las 113 muertes tardías, con la finalidad de hacerlas visibles como parte del problema de la MM en México.

Adicionalmente, este año se incluye un documento metodológico con la descripción de las características incluidas en la Numeralia 2012, así como la manera en que se operacionalizaron para la descripción de la MM del país. Asimismo, el lector o lectora podrá consultar un archivo con las instrucciones y comandos mediante los cuales se obtuvieron los resultados en el paquete estadístico STATA.

Graciela Freyermuth y Marisol Luna.  
Febrero, 2014

- \* La categoría “Servicios federales o estatales de salud” incluye: SSA, IMSS-Oportunidades y Otra unidad pública.
- \* La categoría “Servicios de salud de instituciones de seguridad social” incluye: IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR.<sup>1</sup>
- \* La categoría “Por causas obstétricas indirectas” incluye los Códigos de clasificación CIE-10: B20-B24 más embarazo, F53, M830 y O98-O99.
- \* La categoría “Enfermedades hipertensivas del embarazo” incluye los Códigos de clasificación CIE-10: O10-O16.
- \* La categoría “Otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto” incluye los Códigos de clasificación CIE-10: O21, O23-O43, O47-O66, O68-O71 y O73-O84.
- \* Para las categorías: hablante de lengua indígena, estado civil, escolaridad, afiliación, atención médica y sitio de atención del parto, los valores etiquetados como “Se ignora” se recodificaron a “No especificado” para simplificar el análisis.

Los porcentajes pueden no sumar 100% por efectos de redondeo en los decimales.

Fuente:

INEGI, DGIS/SSA, 2012, *Bases de datos de defunciones*, México.

1.- IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, PEMEX: Petróleos Mexicanos, SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional, SEMAR: Secretaría de Marina-Armada de México.





# **Por residencia habitual de la mujer**



## 960 muertes en 2012

**RMM: 42.7\*** **RMM: 50.5\*\*** **RMM: 42.3\*\*\***

**%**

- 12.8** era menor de 19 años
- 77.7** vivía en unión libre o era casada
- 11.9** era hablante de lengua indígena
- 75.9** se dedicaba al hogar
- 6.9** no tenía escolaridad
- 29.5** contaba con primaria incompleta o completa
- 14.7** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 55.0** contaba con Seguro Popular
- 54.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 18.8** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 11.0** en su casa
  - 9.4** en una unidad médica privada
  - 2.1** en la vía pública
- 87.4** contó con asistencia médica
- 96.7** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 26.8** murió por causas obstétricas indirectas
- 24.9** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 19.1** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 8.2** por aborto
- 11.0** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 42.6** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 19.5** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 72.4** recibió atención de un médico durante el parto
- 47.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 6.9** en su casa

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



# Aguascalientes:

## 13 muertes en 2012

**RMM: 49.2\***    **RMM: 58.2\*\***    **RMM: 47.7\*\*\***

**%**

- 7.7** era menor de 19 años
- 84.6** vivía en unión libre o era casada
- 84.6** se dedicaba al hogar
- 53.8** contaba con secundaria incompleta o completa
- 69.2** contaba con Seguro Popular
- 69.2** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 15.4** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 7.7** en su casa
- 92.3** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 38.5** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 23.1** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 15.4** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 7.7** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 69.2** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 23.1** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 100.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 69.2** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



# Baja California:

## 18 muertes en 2012

**RMM: 31.3\* RMM: 31.3\*\* RMM: 31\*\*\***

**%**

- 5.6** era menor de 19 años
- 72.2** vivía en unión libre o era casada
- 5.6** era hablante de lengua indígena
- 66.7** se dedicaba al hogar
- 27.8** contaba con primaria incompleta o completa
- 27.8** tenía secundaria incompleta o completa
- 5.6** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 55.6** contaba con Seguro Popular
- 61.1** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 33.3** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 100.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 61.1** murió por causas obstétricas indirectas
- 22.2** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 11.1** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 44.4** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 11.1** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 77.8** recibió atención de un médico durante el parto
- 33.3** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



# Baja California Sur:

## 3 muertes en 2012

**RMM: 25.3\***   **RMM: 30.4\*\***   **RMM: 23.3\*\*\***

**%**

- 100.0** tenía entre 25 y 29 años
- 66.7** vivía en unión libre o era casada
- 66.7** era profesionista
- 33.3** contaba con secundaria incompleta o completa
- 33.3** contaba con estudios profesionales
- 33.3** contaba con estudios de posgrado
- 33.3** contaba con Seguro Popular
- 33.3** contaba con seguro de salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR
- 33.3** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 33.3** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 33.3** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 33.3** en una unidad médica privada
- 100.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 66.7** murió por causas obstétricas indirectas
- 33.3** por otras complicaciones, principalmente puerperales
- 66.7** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 100.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 33.3** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 7 muertes en 2012

**RMM: 42.7\***   **RMM: 48\*\***   **RMM: 42.8\*\*\***

**%**

- 57.2** tenía entre 19 y 24 años
- 85.7** vivía en unión libre o era casada
- 57.1** se dedicaba al hogar
- 28.6** contaba con primaria incompleta o completa
- 28.6** contaba con secundaria incompleta o completa
- 28.6** contaba con estudios profesionales
- 85.7** contaba con Seguro Popular
- 71.4** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 14.3** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 14.3** en una unidad médica privada
- 100.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 42.9** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 28.6** por aborto
- 14.3** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 14.3** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 14.3** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 42.9** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 42.9** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 100.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 71.4** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 20 muertes en 2012

**RMM: 37\* RMM: 43.6\*\* RMM: 34.4\*\*\***

**%**

- 10.0** era menor de 19 años
- 75.0** vivía en unión libre o era casada
- 65.0** se dedicaba al hogar
- 30.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 35.0** contaba con secundaria incompleta o completa
- 15.0** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 30.0** contaba con Seguro Popular
- 35.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 50.0** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 5.0** en su casa
- 90.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 30.0** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 20.0** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 15.0** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 15.0** por aborto
- 5.0** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 15.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 5.0** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 30.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 15.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.





## 3 muertes en 2012

**RMM: 22.5\*** **RMM: 29.6\*\*** **RMM: 23.6\*\*\***

**%**

- 66.7** tenía entre 25 y 29 años
- 100.0** vivía en unión libre o era casada
- 66.7** se dedicaba al hogar
- 66.7** contaba con secundaria incompleta o completa
- 100.0** contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR
- 100.0** murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 100.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 66.7** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 33.3** por enfermedades hipertensivas de embarazo
- 33.3** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 33.3** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 100.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 66.7** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 68 muertes en 2012

**RMM: 59.8\* RMM: 72.6\*\* RMM: 60.6\*\*\***

**%**

<b>10.3</b>	era menor de 19 años
<b>85.3</b>	vivía en unión libre o era casada
<b>44.1</b>	era hablante de lengua indígena
<b>86.8</b>	se dedicaba al hogar
<b>38.2</b>	contaba con primaria incompleta o completa
<b>30.9</b>	contaba con secundaria incompleta o completa
<b>20.6</b>	no tenía escolaridad
<b>13.2</b>	no tenía seguridad social ni protección a la salud
<b>75.0</b>	contaba con Seguro Popular
<b>70.6</b>	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
<b>10.3</b>	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
<b>8.8</b>	en su casa
<b>82.2</b>	contó con asistencia médica
<b>97.1</b>	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
<b>27.9</b>	murió por causas obstétricas indirectas
<b>26.5</b>	por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
<b>17.6</b>	por enfermedades hipertensivas del embarazo
<b>16.2</b>	no tuvo control prenatal durante el embarazo
<b>33.8</b>	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
<b>25.0</b>	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
<b>69.1</b>	recibió atención de un médico durante el parto
<b>16.2</b>	fue atendida por una partera
<b>55.9</b>	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
<b>23.5</b>	en su casa

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 32 muertes en 2012

**RMM: 46.6\* RMM: 55.7\*\* RMM: 46.7\*\*\***

**%**

- 15.6** era menor de 19 años
- 56.3** vivía en unión libre o era casada
- 31.3** era hablante de lengua indígena
- 75.0** se dedicaba al hogar
- 25.0** no tenía escolaridad
- 25.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 25.0** contaba con secundaria incompleta o completa
- 25.0** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 25.0** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 40.6** contaba con Seguro Popular
- 31.3** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 18.8** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 21.9** en una unidad médica privada
- 81.3** contó con asistencia médica
- 96.9** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 25.0** murió por causas obstétricas indirectas
- 18.8** por aborto
- 12.5** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 12.5** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 12.5** por complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 25.0** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 28.1** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 12.5** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 59.4** recibió atención de un médico durante el parto
- 25.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 18.8** en su casa

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



# Distrito Federal:

## 56 muertes en 2012

**RMM: 41.9\* RMM: 44\*\* RMM: 40.1\*\*\***

**%**

- 12.5** era menor de 19 años
- 73.2** vivía en unión libre o era casada
- 71.4** se dedicaba al hogar
- 39.3** contaba con secundaria incompleta o completa
- 33.9** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 41.3** contaba con estudios profesionales
- 26.8** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 33.9** contaba con Seguro Popular
- 44.6** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 26.8** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 16.1** en una unidad médica privada
- 94.6** contó con asistencia médica
- 98.2** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 28.6** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 19.6** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 19.6** por causas obstétricas indirectas
- 7.1** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 44.6** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 23.2** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 73.2** recibió atención de un médico durante el parto
- 41.1** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 19 muertes en 2012

**RMM: 56.4\* RMM: 68.3\*\* RMM: 52.5\*\*\***

**%**

- 28.6** tenía entre 19 y 24 años
- 57.9** vivía en unión libre o era casada
- 10.5** era hablante de lengua indígena
- 57.9** se dedicaba al hogar
- 36.8** contaba con primaria incompleta o completa
- 21.1** contaba con secundaria incompleta o completa
- 21.1** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 10.5** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 42.1** contaba con Seguro Popular
- 57.9** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 15.8** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 15.8** en una unidad médica privada
- 84.2** contó con asistencia médica
- 89.5** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 42.1** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 21.1** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 21.1** por causas obstétricas indirectas
- 5.3** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 15.8** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 21.1** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 73.7** recibió atención de un médico durante el parto
- 52.6** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



# Estado de México:

## 130 muertes en 2012

**RMM: 42.4\* RMM: 50.3\*\* RMM: 42.7\*\*\***

**%**

- 10.8** era menor de 19 años
- 76.9** vivía en unión libre o era casada
- 2.3** era hablante de lengua indígena
- 76.2** se dedicaba al hogar
- 79.2** escolaridad no especificada
- 5.4** contaba con primaria incompleta o completa
- 6.2** contaba con secundaria incompleta o completa
- 20.8** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 56.9** contaba con Seguro Popular
- 65.4** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 9.2** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 9.2** en una unidad médica privada
- 13.8** en su casa
- 90.8** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 23.8** murió por causas obstétricas indirectas
- 33.8** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 16.9** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 12.3** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 50.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 22.3** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 78.5** recibió atención de un médico durante el parto
- 0.8** por una partera
- 59.2** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 42 muertes en 2012

**RMM: 36.5\*** **RMM: 44\*\*** **RMM: 34.8\*\*\***

**%**

<b>14.3</b>	era menor de 19 años
<b>76.2</b>	vivía en unión libre o era casada
<b>2.4</b>	era hablante de lengua indígena
<b>73.8</b>	se dedicaba al hogar
<b>33.3</b>	contaba con primaria incompleta o completa
<b>35.7</b>	contaba con secundaria incompleta o completa
<b>21.4</b>	contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
<b>14.3</b>	no tenía seguridad social ni protección a la salud
<b>64.3</b>	contaba con Seguro Popular
<b>59.5</b>	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
<b>16.7</b>	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
<b>14.3</b>	en una unidad médica privada
<b>95.2</b>	contó con asistencia médica
<b>100.0</b>	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
<b>31.0</b>	murió por causas obstétricas indirectas
<b>28.6</b>	por enfermedades hipertensivas del embarazo
<b>23.8</b>	por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
<b>4.8</b>	no tuvo control prenatal durante el embarazo
<b>61.9</b>	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
<b>19.1</b>	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
<b>97.6</b>	recibió atención de un médico durante el parto
<b>64.3</b>	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 56 muertes en 2012

**RMM: 74.8\*** **RMM: 93.1\*\*** **RMM: 75.9\*\*\***

**%**

- 7.1** era menor de 19 años
- 78.6** vivía en unión libre o era casada
- 33.9** era hablante de lengua indígena
- 64.3** se dedicaba al hogar
- 21.4** no tenía escolaridad
- 30.4** contaba con primaria incompleta o completa
- 12.5** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 60.7** contaba con Seguro Popular
- 35.7** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 26.8** en su casa
- 16.1** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 64.3** contó con asistencia médica
- 92.9** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 35.7** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 23.2** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 19.6** por causas obstétricas indirectas
- 28.6** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 28.6** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 30.4** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 48.2** recibió atención de un médico durante el parto
- 17.9** por una partera
- 39.3** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 26.8** en su casa

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.





## 21 muertes en 2012

**RMM: 37.7\* RMM: 48.4\*\* RMM: 37.8\*\*\***

**%**

- 4.8** era menor de 19 años
- 76.2** vivía en unión libre o era casada
- 28.6** era hablante de lengua indígena
- 81.0** se dedicaba al hogar
- 38.1** contaba con primaria incompleta o completa
- 26.8** contaba con secundaria incompleta o completa
- 14.3** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 61.9** contaba con Seguro Popular
- 61.9** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 19.0** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
  - 9.5** en unidad médica privada
  - 9.5** en su casa
- 90.5** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 33.3** murió por causas obstétricas indirectas
  - 19.0** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
  - 14.3** por aborto
- 14.3** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 47.6** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 23.8** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 76.2** recibió atención de un médico durante el parto
  - 4.8** por una partera
- 57.1** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
  - 4.8** en su casa

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 36 muertes en 2012

**RMM: 24.2\*** **RMM: 29\*\*** **RMM: 23.4\*\*\***

**%**

- 5.6** era menor de 19 años
- 77.8** vivía en unión libre o era casada
- 86.1** se dedicaba al hogar
- 38.9** contaba con primaria incompleta o completa
- 27.8** contaba con secundaria incompleta o completa
- 16.7** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 11.1** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 47.2** contaba con Seguro Popular
- 47.2** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 27.8** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 11.1** en su casa
- 91.7** contó con asistencia médica
- 97.2** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 36.1** murió por causas obstétricas indirectas
- 16.7** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 13.9** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 13.9** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 2.8** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 75.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 25.0** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 83.3** recibió atención de un médico durante el parto
- 44.4** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 40 muertes en 2012

**RMM: 44.1\* RMM: 57.4\*\* RMM: 41.7\*\*\***

**%**

<b>15.0</b>	era menor de 19 años
<b>87.5</b>	vivía en unión libre o era casada
<b>5.0</b>	era hablante de lengua indígena
<b>72.5</b>	se dedicaba al hogar
<b>37.5</b>	contaba con primaria incompleta o completa
<b>30.0</b>	contaba con secundaria incompleta o completa
<b>17.5</b>	contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
<b>10.0</b>	no tenía seguridad social ni protección a la salud
<b>60.0</b>	contaba con Seguro Popular
<b>55.0</b>	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
<b>20.0</b>	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
<b>7.5</b>	en una unidad médica privada
<b>7.5</b>	en su casa
<b>7.5</b>	en la vía pública
<b>82.5</b>	contó con asistencia médica
<b>100.0</b>	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
<b>22.5</b>	murió por causas obstétricas indirectas
<b>22.5</b>	por enfermedades hipertensivas del embarazo
<b>20.0</b>	por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
<b>42.5</b>	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
<b>17.5</b>	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
<b>75.0</b>	recibió atención de un médico durante el parto
<b>2.5</b>	por una partera
<b>47.5</b>	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 13 muertes en 2012

**RMM: 37.7\* RMM: 46.4\*\* RMM: 39\*\*\***

**%**

- 23.1** era menor de 19 años
- 69.2** vivía en unión libre o era casada
- 100.0** se dedicaba al hogar
- 69.2** contaba con primaria incompleta o completa
- 15.4** contaba con secundaria incompleta o completa
- 15.4** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 23.1** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 61.5** contaba con Seguro Popular
- 69.2** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 15.4** en su casa
  - 7.7** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
  - 7.7** en una unidad médica privada
- 84.6** contó con asistencia médica
- 76.9** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 38.5** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 23.1** por causas obstétricas indirectas
- 15.4** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 23.1** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 38.5** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
  - 7.7** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 84.6** recibió atención de un médico durante el parto
- 69.2** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 10 muertes en 2012

**RMM: 46.1\*** **RMM: 61.5\*\*** **RMM: 45.5\*\*\***

**%**

- 10.0** era menor de 19 años
- 80.0** vivía en unión libre o era casada
- 30.0** era hablante de lengua indígena
- 90.0** se dedicaba al hogar
- 20.0** no tenía escolaridad
- 20.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 60.0** contaba con secundaria incompleta o completa
- 20.0** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 70.0** contaba con Seguro Popular
- 40.0** murió en su casa
- 30.0** en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 20.0** en una unidad médica privada
- 50.0** contó con asistencia médica
- 70.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 30.0** murió por causas obstétricas indirectas
- 20.0** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 20.0** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 20.0** por otras complicaciones, principalmente puerperales
- 60.0** inició el cuidado prenatal en el séptimo mes del embarazo
- 20.0** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 50.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 30.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 20.0** por una partera
- 20.0** en su casa

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 22 muertes en 2012

**RMM: 25.8\* RMM: 29.5\*\* RMM: 26.6\*\*\***

**%**

- 13.6** era menor de 19 años
- 63.6** vivía en unión libre o era casada
- 77.3** se dedicaba al hogar
- 13.6** contaba con primaria incompleta o completa
- 45.5** contaba con secundaria incompleta o completa
- 27.3** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 13.6** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 36.4** contaba con Seguro Popular
- 50.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 36.4** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 9.1** en una unidad médica privada
- 95.5** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 36.4** murió por causas obstétricas indirectas
- 22.7** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 13.6** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 13.6** por aborto
- 4.5** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 45.5** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 9.1** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 95.5** recibió atención de un médico durante el parto
- 49.9** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 53 muertes en 2012

**RMM: 64.6\* RMM: 81.1\*\* RMM: 65.3\*\*\***

**%**

- 17.0** era menor de 19 años
- 75.5** vivía en unión libre o era casada
- 39.2** era hablante de lengua indígena
- 77.4** se dedicaba al hogar
- 64.2** contaba con primaria incompleta o completa
- 15.1** contaba con secundaria incompleta o completa
- 28.3** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 50.9** contaba con Seguro Popular
- 45.3** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 11.3** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 28.8** en su casa
- 71.7** contó con asistencia médica
- 92.5** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 32.1** murió por causas obstétricas indirectas
- 24.5** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 18.9** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 7.5** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 24.5** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 7.6** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 47.2** recibió atención de un médico durante el parto
- 3.8** por una partera
- 30.2** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 11.3** en su casa

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 64 muertes en 2011

**RMM: 49.8\*** **RMM: 58.5\*\*** **RMM: 50.6\*\*\***

**%**

<b>15.6</b>	era menor de 19 años
<b>84.4</b>	vivía en unión libre o era casada
<b>10.9</b>	era hablante de lengua indígena
<b>84.4</b>	se dedicaba al hogar
<b>43.8</b>	contaba con primaria incompleta o completa
<b>23.4</b>	contaba con secundaria incompleta o completa
<b>9.4</b>	no tenía seguridad social ni protección a la salud
<b>54.7</b>	contaba con Seguro Popular
<b>53.1</b>	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
<b>14.1</b>	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
<b>10.9</b>	no especificado
<b>10.9</b>	en una unidad médica privada
<b>89.1</b>	contó con asistencia médica
<b>90.6</b>	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
<b>28.1</b>	murió por causas obstétricas indirectas
<b>26.6</b>	por enfermedades hipertensivas del embarazo
<b>23.4</b>	por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
<b>6.8</b>	por aborto
<b>7.8</b>	no tuvo control prenatal durante el embarazo
<b>39.1</b>	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
<b>25.0</b>	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
<b>67.2</b>	recibió atención de un médico durante el parto
<b>39.1</b>	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
<b>7.8</b>	por una partera
<b>10.9</b>	en su casa

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.





## 8 muertes en 2012

**RMM: 21.2\*** **RMM: 24.4\*\*** **RMM: 19.8\*\*\***

**%**

- 12.5** era menor de 19 años
- 75.0** vivía en unión libre o era casada
- 12.5** era hablante de lengua indígena
- 62.5** se dedicaba al hogar
- 25.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 37.5** contaba con secundaria incompleta o completa
- 12.5** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 50.0** contaba con Seguro Popular
- 37.5** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 25.0** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 87.5** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 25.0** murió por causas obstétricas indirectas
- 37.5** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 12.5** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 12.5** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 50.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 25.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 14 muertes en 2012

**RMM: 50.8\*** **RMM: 49.8\*\*** **RMM: 50.4\*\*\***

**%**

- 37.5** tenía entre 25 y 29 años
- 92.9** vivía en unión libre o era casada
- 64.3** se dedicaba al hogar
- 42.9** contaba con primaria incompleta o completa
- 14.3** contaba con secundaria incompleta o completa
- 14.3** contaba con estudios profesionales
- 14.3** no tenía escolaridad
- 23.1** contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR
- 61.5** contaba con Seguro Popular
- 57.1** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 21.4** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 21.4** no especificado
- 78.6** contó con asistencia médica
- 92.9** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 35.7** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 35.7** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 21.4** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 7.1** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 21.4** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 35.7** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 64.3** recibió atención de un médico durante el parto
- 42.9** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 22 muertes en 2012

**RMM: 40.8\*** **RMM: 48\*\*** **RMM: 40.7\*\*\***

**%**

- 22.7** tenía entre 19 y 24 años
- 90.9** vivía en unión libre o era casada
- 72.7** era hablante de lengua indígena
- 91.7** se dedicaba al hogar
- 27.3** contaba con primaria incompleta o completa
- 22.7** contaba con secundaria incompleta o completa
- 4.5** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 50.0** contaba con Seguro Popular
- 31.8** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 22.7** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 13.6** en una unidad médica privada
- 13.6** en la vía pública
- 90.9** contó con asistencia médica
- 95.5** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 31.8** murió por causas obstétricas indirectas
- 22.7** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 18.2** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 4.5** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 54.5** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 36.4** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 72.7** recibió atención de un médico durante el parto
- 40.9** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 22 muertes en 2012

**RMM: 40.2\*** **RMM: 50.8\*\*** **RMM: 41.5\*\*\***

**%**

- 18.2** era menor de 19 años
- 81.8** vivía en unión libre o era casada
- 63.6** se dedicaba al hogar
- 27.3** contaba con secundaria incompleta o completa
- 27.3** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 9.1** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 45.5** contaba con Seguro Popular
- 50.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 31.8** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
  - 9.1** en una unidad médica privada
  - 9.1** en su casa
- 81.8** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 22.7** murió por causas obstétricas indirectas
  - 18.2** por enfermedades hipertensivas del embarazo
  - 22.7** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 27.3** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 50.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 22.7** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 31.8** tuvo más de cinco consultas prenatales
- 72.7** recibió atención de un médico durante el parto
- 40.9** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 17 muertes en 2011

**RMM: 32.4\*** **RMM: 40.1\*\*** **RMM: 33.2\*\*\***

**%**

<b>23.5</b>	era menor de 19 años
<b>76.5</b>	vivía en unión libre o era casada
<b>52.9</b>	se dedicaba al hogar
<b>35.3</b>	contaba con secundaria incompleta o completa
<b>29.4</b>	contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
<b>58.8</b>	contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR
<b>29.4</b>	contaba con Seguro Popular
<b>23.5</b>	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
<b>58.8</b>	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
<b>11.8</b>	en una unidad médica privada
<b>100.0</b>	contó con asistencia médica
<b>100.0</b>	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
<b>41.2</b>	murió por causas obstétricas indirectas
<b>17.6</b>	por enfermedades hipertensivas del embarazo
<b>17.6</b>	por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
<b>11.8</b>	no tuvo control prenatal durante el embarazo
<b>35.3</b>	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
<b>35.3</b>	tuvo más de cinco consultas prenatales
<b>88.2</b>	recibió atención de un médico durante el parto
<b>17.6</b>	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 17 muertes en 2012

**RMM: 36.4\*** **RMM: 45.6\*\*** **RMM: 34.2\*\*\***

**%**

- 23.5** era menor de 19 años
- 82.4** vivía en unión libre o era casada
- 94.1** se dedicaba al hogar
- 35.3** contaba con primaria incompleta o completa
- 29.4** contaba con secundaria incompleta o completa
- 82.4** contaba con Seguro Popular
- 64.7** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 17.6** en otro lugar
- 11.8** en una unidad médica privada
- 94.1** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 47.1** murió por causas obstétricas indirectas
- 17.6** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 5.9** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 58.8** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 17.7** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 94.1** recibió atención de un médico durante el parto
- 64.7** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 16 muertes en 2011

**RMM: 25.6\*** **RMM: 29.1\*\*** **RMM: 26\*\*\***

**%**

<b>12.5</b>	era menor de 19 años
<b>93.8</b>	vivía en unión libre o era casada
<b>6.3</b>	era hablante de lengua indígena
<b>81.3</b>	se dedicaba al hogar
<b>37.5</b>	contaba con primaria incompleta o completa
<b>31.3</b>	contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
<b>31.3</b>	no tenía seguridad social ni protección a la salud
<b>43.8</b>	contaba con Seguro Popular
<b>56.3</b>	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
<b>18.8</b>	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
<b>18.8</b>	en una unidad médica privada
<b>93.8</b>	contó con asistencia médica
<b>100.0</b>	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
<b>43.8</b>	murió por causas obstétricas indirectas
<b>18.8</b>	por enfermedades hipertensivas del embarazo
<b>18.8</b>	por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
<b>18.8</b>	no tuvo control prenatal durante el embarazo
<b>43.8</b>	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
<b>6.3</b>	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
<b>31.3</b>	tuvo más de cinco consultas prenatales
<b>68.1</b>	recibió atención de un médico durante el parto
<b>50.0</b>	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 16 muertes en 2012

**RMM: 63.3\*** **RMM: 73.3\*\*** **RMM: 59.4\*\*\***

**%**

- 25.0** era menor de 19 años
- 75.0** vivía en unión libre o era casada
- 62.5** se dedicaba al hogar
- 43.8** contaba con secundaria incompleta o completa
- 25.0** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 12.5** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 68.8** contaba con Seguro Popular
  
- 62.5** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 12.5** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 12.5** en su casa
  
- 93.8** contó con asistencia médica
- 93.8** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
  
- 25.0** murió por aborto
- 25.0** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 18.8** por causas obstétricas indirectas
  
- 6.3** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 62.5** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 18.8** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 37.5** tuvo más de cinco consultas prenatales
  
- 87.5** recibió atención de un médico durante el parto
- 62.5** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.





## 72 muertes en 2012

**RMM: 50.7\* RMM: 57.6\*\* RMM: 51\*\*\***

**%**

<b>19.4</b>	era menor de 19 años
<b>76.4</b>	vivía en unión libre o era casada
<b>5.6</b>	era hablante de lengua indígena
<b>84.7</b>	se dedicaba al hogar
<b>38.9</b>	contaba con primaria incompleta o completa
<b>26.4</b>	contaba con secundaria incompleta o completa
<b>18.1</b>	no tenía seguridad social ni protección a la salud
<b>52.8</b>	contaba con Seguro Popular
<b>65.3</b>	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
<b>15.3</b>	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
<b>6.9</b>	en una unidad médica privada
<b>6.9</b>	en su casa
<b>88.9</b>	contó con asistencia médica
<b>97.2</b>	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
<b>22.2</b>	murió por causas obstétricas indirectas
<b>26.4</b>	por enfermedades hipertensivas del embarazo
<b>18.1</b>	por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
<b>9.7</b>	no tuvo control prenatal durante el embarazo
<b>48.6</b>	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
<b>18.1</b>	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
<b>38.9</b>	tuvo más de cinco consultas prenatales
<b>80.6</b>	recibió atención de un médico durante el parto
<b>56.9</b>	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
<b>1.4</b>	por una partera
<b>2.8</b>	en su casa

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 20 muertes en 2012

**RMM: 50.6\* RMM: 59.1\*\* RMM: 50.1\*\*\***

**%**

- 25.0** era menor de 19 años
- 70.0** vivía en unión libre o era casada
- 5.0** era hablante de lengua indígena
- 80.0** se dedicaba al hogar
- 25.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 40.0** contaba con secundaria incompleta o completa
- 25.0** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 25.0** contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR
- 75.0** contaba con Seguro Popular
- 65.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 20.0** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 95.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 30.0** murió por causas obstétricas indirectas
- 40.0** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 20.0** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 10.0** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 20.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 5.0** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 5.0** tuvo más de cinco consultas prenatales
- 40.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 25.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.



## 10 muertes en 2011

**RMM: 31.9\* RMM: 41\*\* RMM: 32\*\*\***

**%**

- 40.0** tenía entre 20 y 24 años
- 80.0** vivía en unión libre o era casada
- 8.3** era hablante de lengua indígena
- 70.0** se dedicaba al hogar
- 30.0** contaba con primaria incompleta o completa
- 30.0** contaba con secundaria incompleta o completa
- 30.0** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 40.0** contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR
- 60.0** contaba con Seguro Popular
- 50.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 40.0** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 100.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 40.0** murió por causas obstétricas indirectas
- 10.0** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 10.0** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 30.0** por aborto
- 10.0** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 40.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 40.0** tuvo más de cinco consultas prenatales
- 100.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 60.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

\*\* Calculada con las proyecciones de población del CONAPO 2005-2030.

\*\*\* Calculada con certificados de nacimiento del SINAC.





# **Por tipo de afiliación en salud**



# No afiliadas a algún servicio de salud: 141 muertes en 2012

## De las mujeres que fallecieron por muerte materna:

**%**

- 40.4** murió en el Estado de México, el Distrito Federal y Oaxaca
- 13.5** era menor de 19 años
- 15.6** era hablante de lengua indígena
- 78.0** vivía en unión libre o era casada
- 80.9** se dedicaba al hogar
- 24.1** contaba con primaria incompleta o completa
- 26.2** contaba con secundaria incompleta o completa
- 47.5** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 21.3** en una unidad médica privada
- 20.6** en la vía pública
- 81.6** contó con asistencia médica
- 95.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 24.8** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 21.3** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 19.9** por causas obstétricas indirectas
- 12.1** por aborto
- 13.5** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 36.9** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 19.1** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 67.4** recibió atención de un médico durante el parto
  - 7.1** por una partera
- 36.9** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

## 165 muertes en 2012

### De las mujeres que fallecieron por muerte materna:

**%**

- 30.3** murió en el Estado de México, el Distrito Federal, Jalisco y Veracruz
- 1.8** era menor de 19 años
- 0.6** era hablante de lengua indígena
- 77.6** vivía en unión libre o era casada
- 52.7** se dedicaba al hogar
- 24.8** contaba con secundaria incompleta o completa
- 27.9** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 75.8** murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
  - 7.3** en una unidad médica privada
  - 6.7** en la vía pública
- 92.1** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 33.9** murió por causas obstétricas indirectas
- 25.5** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 13.3** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 10.9** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 10.3** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 48.5** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 12.7** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 73.3** recibió atención de un médico durante el parto
- 57.6** atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social



# Afiliadas al ISSSTE:

## 30 muertes en 2012

### De las mujeres que fallecieron por muerte materna:

**0%**

- 34.1** murió en el Distrito Federal, Guerrero y Puebla
- 3.3** era menor de 19 años
- 3.3** era hablante de lengua indígena
- 76.7** vivía en unión libre o era casada
- 23.3** se dedicaba al hogar
- 16.7** tenía secundaria incompleta o completa
- 66.7** contaba con estudios profesionales
- 83.3** murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
  - 6.7** en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
  - 6.7** en la vía pública
- 90.0** contó con asistencia médica
- 93.3** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 26.7** murió por causas obstétricas indirectas
- 40.0** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 13.3** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 13.3** por aborto
- 19.1** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 36.7** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
  - 3.3** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 80.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 66.7** atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

# Afiliadas al Seguro Popular:

## 528 muertes en 2012

### De las mujeres que fallecieron por muerte materna:

**%**

- 30.9** murió en el Estado de México, Chiapas y Veracruz
- 11.4** era menor de 19 años
- 14.0** era hablante de lengua indígena
- 79.5** vivía en unión libre o era casada
- 85.8** se dedicaba al hogar
- 35.6** contaba con primaria incompleta o completa
- 26.9** tenía secundaria incompleta o completa
- 76.6** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
  - 8.5** en la vía pública
  - 6.1** en una unidad médica privada
- 89.6** contó con asistencia médica
- 97.7** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 26.7** murió por causas obstétricas indirectas
- 26.7** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 19.3** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 12.9** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 9.5** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 43.2** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 22.2** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 74.8** recibió atención de un médico durante el parto
- 66.3** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

# Afiliadas a PEMEX, SEDENA o SEMAR:

## 1 muerte en 2012

### La mujer que falleció por muerte materna:

**%**

- 100.0** murió en Colima
- 100.0** tenía entre 25 y 29 años
- 100.0** vivía en unión libre o era casada
- 100.0** se dedicaba al hogar
- 100.0** contaba con secundaria incompleta o completa
- 100.0** murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 100.0** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 100.0** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 100.0** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 100.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 100.0** atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

# Afiliadas a otra institución de salud:

## 12 muertes en 2012

**De las mujeres que fallecieron por muerte materna:**

**%**

- 66.7** murió en el Estado de México, Chihuahua y Nuevo León
- 8.3** era menor de 19 años
- 8.3** era hablante de lengua indígena
- 75.0** vivía en unión libre o era casada
- 50.0** se dedicaba al hogar
- 33.3** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 33.3** no especificado
- 25.0** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 16.7** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
- 50.0** en una unidad médica privada
- 91.7** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 33.3** murió por causas obstétricas indirectas
- 33.3** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 16.7** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 8.3** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 16.7** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 33.3** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 16.7** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 66.7** recibió atención de un médico durante el parto
- 33.3** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 33.3** en una unidad médica privada

# **Por lugar de ocurrencia de la defunción**



## 518 muertes en 2012

### De las mujeres que fallecieron por muerte materna:

**%**

- 34.7** murió en el Estado de México, Chiapas y Veracruz
- 13.1** era menor de 19 años
- 12.4** era hablante de lengua indígena
- 77.2** vivía en unión libre o era casada
- 82.6** se dedicaba al hogar
- 31.7** contaba con primaria incompleta o completa
- 27.8** contaba con secundaria incompleta o completa
- 16.2** no especificado
- 12.9** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 78.2** contaba con Seguro Popular
- 95.2** contó con asistencia médica
- 98.3** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 17.8** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 28.0** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 27.4** por causas obstétricas indirectas
- 12.5** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 10.6** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 43.1** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 22.0** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 80.3** recibió atención de un médico durante el parto
- 74.3** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

# Servicios de salud de las instituciones de seguridad social:

## 180 muertes en 2012

### De las mujeres que fallecieron por muerte materna:

**%**

- 21.1** murió en el Estado de México, el Distrito Federal y Veracruz
- 2.8** era menor de 19 años
- 5.6** era hablante de lengua indígena
- 79.4** vivía en unión libre o era casada
- 54.4** se dedicaba al hogar
- 26.1** contaba con secundaria incompleta o completa
- 25.6** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
- 20.6** contaba con estudios profesionales
  
- 3.9** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 69.4** era derechohabiente del IMSS
- 5.0** contaba con Seguro Popular
  
- 93.9** contó con asistencia médica
- 100.0** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
  
- 33.3** murió por causas obstétricas indirectas
- 29.4** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 12.8** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 12.2** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
  
- 10.6** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 43.9** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 14.4** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
  
- 80.0** recibió atención de un médico durante el parto
- 70.0** atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social



## 90 muertes en 2012

### De las mujeres que fallecieron por muerte materna:

**%**

**38.9** murió en el Estado de México, el Distrito Federal, Chihuahua y Puebla

**5.6** era menor de 19 años

**2.2** era hablante de lengua indígena

**83.3** vivía en unión libre o era casada

**78.9** se dedicaba al hogar

**16.7** contaba con primaria incompleta o completa

**31.1** contaba con secundaria incompleta o completa

**25.6** no especificado

**33.3** no tenía seguridad social ni protección a la salud

**35.6** contaba con Seguro Popular

**91.1** contó con asistencia médica

**97.8** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**18.9** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**16.7** por enfermedades hipertensivas del embarazo

**21.1** por causas obstétricas indirectas

**15.6** por otras complicaciones, principalmente puerperales

**8.9** no tuvo control prenatal durante el embarazo

**47.8** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**15.6** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**81.1** recibió atención de un médico durante el parto

**76.6** atendió el parto en una clínica u hospital privado

## 106 muertes en 2012

### De las mujeres que fallecieron por muerte materna:

**%**

- 41.5** murió en Guerrero, el Estado de México y Oaxaca
- 6.6** era menor de 19 años
- 24.5** era hablante de lengua indígena
- 75.5** vivía en unión libre o era casada
- 72.6** se dedicaba al hogar
- 25.5** no tenía escolaridad
- 25.5** no especificado
- 23.6** contaba con secundaria incompleta o completa
- 27.4** no tenía seguridad social ni protección a la salud
- 42.5** contaba con Seguro Popular
- 48.1** contó con asistencia médica
- 87.7** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 26.4** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
- 27.4** por causas obstétricas indirectas
- 10.4** por enfermedades hipertensivas del embarazo
- 13.2** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
- 10.4** por aborto
- 15.1** no tuvo control prenatal durante el embarazo
- 37.7** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 17.0** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
- 34.9** recibió atención de un médico durante el parto
- 9.4** por una partera
- 26.4** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 28.3** en su casa

# **Muertes maternas tardías**



# Muertes maternas tardías y por coriocarcinoma:\*

**113 muertes en 2012**

**De las mujeres que fallecieron por muerte materna:**

**%**

- 15.9** era menor de 20 años
- 3.5** era hablante de lengua indígena
- 79.6** vivía en unión libre o era casada
- 78.7** se dedicaba al hogar
- 34.5** contaba con secundaria incompleta o completa
- 4.0** no tenía escolaridad
- 40.7** contaba con seguridad social
- 44.0** contaba con Seguro Popular
- 77.9** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 18.5** en su casa
- 94.7** contó con asistencia médica
- 95.6** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico
- 60.0** murió por causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto
- 19.0** por secuelas de causas obstétricas directas
- 53.1** vivía en un municipio de grado de marginación muy bajo
- 74.3** se ignora si tuvo control prenatal durante el embarazo
- 11.5** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
- 9.7** tuvo más de cinco consultas prenatales
- 54.9** recibió atención de un médico durante el parto
- 31.0** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
- 0.9** en su casa

\* Causas de muerte C58X, D39, O96X y O97X.

Para mayor información consulta nuestra página:  
[www.omm.org.mx](http://www.omm.org.mx)

o escríbenos a:  
[observatoriomuertematerna@gmail.com](mailto:observatoriomuertematerna@gmail.com)



y síguenos en *twitter*:  
[@observatoriomm](https://twitter.com/observatoriomm)



y en *facebook*:  
Omm En México

Observatorio de Mortalidad Materna en México  
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,  
Casa Chata: Hidalgo y Matamoros s/n, Col. Tlalpan, Deleg. Tlalpan, México,  
D.F., C.P. 14000  
Teléfono provisional: (01 55) 5487 7100 ext. 1606

# Observatorio de Mortalidad Materna en México

## Numeralia 2012. Mortalidad Materna en México

Freyermuth, Graciela, Luna, Marisol, 2014, *Numeralia 2012. Mortalidad Materna en México*, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)/World Vision México, Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), México, 61 pp.

Esta publicación contó con el apoyo financiero del CIESAS y la Fundación MacArthur en México para su elaboración y de World Vision México para su reproducción.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos definitiva de mortalidad materna, Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud, México, 2013.

Validación: José Alberto Muños

Diseño: Ana Laura García

Corrección de estilo: Laura E. Martínez B.

ISBN: 978-607-95862-6-3











[www.omm.org.mx](http://www.omm.org.mx)

[observatoriomuertematerna@gmail.com](mailto:observatoriomuertematerna@gmail.com)

 [@observatoriommm](https://twitter.com/observatoriommm)

 [OMM En México](https://www.facebook.com/omm.en.mexico)

ISBN: 978-607-95862-6-3