



NUMERALIA  
2 0 1 3

*Mortalidad Materna  
en México*

---

**Autoría:**

Graciela Freyermuth  
Marisol Luna  
José A. Muños

**Revisión editorial:**

Graciela Freyermuth  
María del Pilar Ochoa

**Corrección de estilo:**

Laura Elena Martínez

**Diseño:**

Julieta Abeyta

Numeralia 2013. Mortalidad Materna en México  
2015 Primera edición

Observatorio de Mortalidad Materna en México  
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social  
Juárez 87, Col. Tlalpan, C.P. 14000, México DF.

Numeralia 2013. Mortalidad Materna en México by Observatorio de Mortalidad  
Materna en México / CIESAS is licensed under a Licencia de Creative Commons  
Reconocimiento-CompartirIgual 2.5 México

ISBN: 978-607-96775-0-3



Impreso y hecho en México.

---

# ÍNDICE

---

---

05 Presentación

07 Notas técnicas

---

09 Por residencia habitual  
de la mujer

45 Por tipo de afiliación  
en salud

---

55 Por lugar de ocurrencia  
de la defunción

---



# PRESENTACIÓN

---

El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) tiene entre sus mandatos, crear un sistema de indicadores que facilite el análisis, la evaluación, el monitoreo y la vigilancia sistemática de procesos y resultados de políticas, estrategias, programas y servicios encaminados a reducir la mortalidad materna (MM), así como contar con los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a información confiable, oportuna y periódica que haga posible su uso para el análisis y la prevención de las muertes maternas en México. La publicación que se ha hecho año con año desde 2010 de la Numeralia y de los Indicadores obedece a dicho mandato.

La Numeralia 2013 brinda una mirada rápida de la información más relevante de las defunciones maternas ocurridas y registradas durante 2013 en el país, con el objetivo de resaltar aquellos aspectos particulares en el comportamiento de la MM de acuerdo con la entidad de residencia habitual, la condición de aseguramiento en salud de la mujer y el lugar de ocurrencia de la defunción; por ello no pretende que el o la lectora tenga una visión comparable por entidad federativa, por condición de aseguramiento en salud o por lugar de defunción. Sin embargo, la información comparada podrá ser consultada en la publicación de los Indicadores de 2013.

La Numeralia de Mortalidad Materna en México para el año 2013 se elaboró a partir de la información obtenida de la base de datos de mortalidad de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud (SSA), que año con año es publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) después de ser validada. Se han incluido en esta sistematización los porcentajes de datos sociodemográficos y de acceso a servicios de salud que se consideran

de mayor relevancia, para que quienes estén interesados en esta problemática tengan acceso a información desagregada para cada estado de la República Mexicana; asimismo, se ha incorporado la Razón de Mortalidad Materna (RMM), definida como el número de defunciones de mujeres mientras se encuentren embarazadas o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo y debida a cualquier causa relacionada con, o agravada por, el embarazo mismo o su atención (con exclusión de las muertes accidentales o incidentales), en un determinado año y por cada 100 mil nacidos vivos.

En la Numeralia 2013 se incluyen dos estimaciones de la RMM a partir del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) y de las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en las proyecciones de la población de México 2010-2050.

El SINAC utiliza como denominador los nacimientos registrados a partir de los certificados de nacimiento con corrección del subregistro por la DGIS en nueve entidades federativas: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Las y los lectores podrán identificar los cambios en esta Razón a partir de la modificación del denominador. En la segunda estimación se utilizaron las nuevas estimaciones del CONAPO que se publicaron en 2012, obtenidas a partir de la conciliación demográfica 1990-2010 y de las proyecciones nacionales y por entidad 2010-2050, Versión Censo 2010, realizadas con los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010.

De esta manera, si se estima la RMM Nacional con las proyecciones de nacidos vivos del CONAPO que se han utilizado para dar

---

seguimiento a la MM desde el periodo 1990 - 2010, podemos reconocer que la RMM con el número de nacidos vivos estimados fue de 38.3 y con la información de los certificados de nacimiento la estimación de la RMM es de 38.2. Incluir las estimaciones de la RMM a partir de las proyecciones posibilita la comparación entre numeralias. Las diferencias entre estas dos mediciones llegan a ser de cuando mucho tres puntos.

Para la mejor comprensión de la dimensión del problema de la MM en cada entidad federativa se ha incluido su RMM, que servirá para reconocer cuáles son las entidades que están enfrentando de mejor manera esta situación. El lector podrá comparar estos datos con las Numeralias 2009, 2010, 2011 y 2012.

En la Numeralia 2013 se sigue incluyendo la adscripción étnica de las fallecidas a través del identificador conocido como “Hablante de lengua indígena”, así como información relativa a los antecedentes de atención materna de las fallecidas, datos que no se encuentran disponibles en la base de mortalidad publicada por el INEGI y solamente se localizan en la base que elabora la DGIS. Se incorporan nuevamente otras variables de interés: lugar de ocurrencia de la muerte, condición de aseguramiento de la fallecida y causa de muerte relacionada con el aborto, aun cuando ésta no es parte de las principales causas de muerte materna de los estados. Todo esto permitirá al Observatorio dar seguimiento al número de muertes por institución.

En 2013 hubo 1 013 muertes maternas en total, 60 menos que en 2012. Sin embargo, el número de muertes maternas incluido en las distribuciones por entidad federativa en esta Numeralia es el que se considera oficialmente

para estimar la RMM (861), por lo que no están contabilizadas las que fueron resultado del coriocarcinoma ni las que ocurrieron después de 42 días del parto, es decir, las denominadas tardías.

En esta Numeralia 2013 al igual que en 2012 se incluyen los datos más relevantes de las 152 muertes tardías (39 más que en 2012) con la finalidad de hacerlas visibles como parte del problema de la MM en México.

Este año se incluye un documento metodológico con la descripción de la construcción de las variables de la Numeralia 2013, así como la manera en que se operacionalizaron para la descripción de la MM del país. Asimismo, el lector o lectora podrá consultar un archivo con las instrucciones y comandos mediante los cuales se obtuvieron los resultados en el paquete estadístico STATA.

*Graciela Freyermuth y Marisol Luna.*  
Febrero 13, 2015

# NOTAS TÉCNICAS

---

La categoría “Servicios federales o estatales de salud” incluye:  
SSA, IMSS-Oportunidades y Otra unidad pública.

La categoría “Servicios de salud de instituciones de seguridad social” incluye: IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR.<sup>1</sup>

La categoría “Por causas obstétricas indirectas” incluye los Códigos de clasificación CIE-10: B20- B24 más embarazo, F53, M830 y O98-O99.

La categoría “Enfermedades hipertensivas del embarazo” incluye los Códigos de clasificación CIE-10: O10-O16.

La categoría “Otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto” incluye los Códigos de clasificación CIE-10: O21, O23-O43, O47-O66, O68-O71 y O73-O84.

Para las características: hablante de lengua indígena, estado conyugal, escolaridad, institución de afiliación en salud, atención médica, lugar de atención del parto, persona que atendió el parto, ocupación laboral, lugar de ocurrencia de la defunción, persona que certificó la defunción, mes de inicio de control prenatal y número de consultas prenatales, los valores etiquetados como “Se ignora” se recodificaron a “No especificado” para simplificar el análisis.

---

<sup>1</sup> IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, PEMEX: Petróleos Mexicanos, SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional, SEMAR: Secretaría de Marina-Armada de México.





---

**POR  
RESIDENCIA  
HABITUAL  
DE LA MUJER**

---



# NACIONAL

861 muertes en 2013 | RMM: 38.2\*



**0.7%**

tenía entre 10 y 14 años de edad

**79.7%**

vivía en unión libre o era casada

**11.3%**

era hablante de lengua indígena

**73.2%**

se dedicaba al hogar

**6.2%** no tenía escolaridad

**32.3%** contaba con secundaria incompleta o completa

**12.7%** no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**51.6%** contaba con Seguro Popular

**57.6%** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**18.9%** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**9.9%**

en su casa

**7.9%**

en una unidad médica privada

**1.6%**

en la vía pública

**86.0%** contó con asistencia médica

**96.5%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**28.2%**

murió por causas obstétricas indirectas

**23.7%**

por enfermedades hipertensivas del embarazo

**17.5%**

por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**8.9%**

por aborto

**13.0%** no tuvo control prenatal durante el embarazo

**34.0%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**16.6%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**64.0%** recibió atención de un médico durante el parto

**41.1%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**4.9%** en su casa

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 38.3.

# NACIONAL TARDÍAS

152 muertes en 2013 | Muertes maternas tardías y por coriocarcinoma\*



**7.9%**

era menor de 19 años

**78.3%**

vivía en unión libre o era casada

**5.3%**

era hablante de lengua indígena

**77.0%**

se dedicaba al hogar

**4.0%** no tenía escolaridad

**39.5%** contaba con secundaria incompleta o completa

**12.5%**

no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**46.7%**

contaba con Seguro Popular

**72.4%** murió en una clínica u hospital del servicio público de salud

**24.3%** en su casa

**90.8%** contó con asistencia médica

**96.7%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**55.3%** murió por causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto

**25.0%** por secuelas de causas obstétricas directas

**69.1%** se ignora si tuvo control prenatal durante el embarazo

**59.2%** recibió atención de un médico durante el parto

**16.5%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**31.6%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud


**7.9%** tuvo más de cinco consultas prenatales

**1.3%** en su casa

\*Causas de muerte CIE-10: O96X, O97X y C58X.

# AGUASCALIENTES

7 muertes en 2013 | RMM: 25.7\*



**10.9%**  
era menor de 19 años

**85.7%**  
vivía en unión libre o  
era casada

**71.4%**  
se dedicaba al hogar

**28.6%**  
contaba con primaria  
incompleta o completa

**42.9%**  
contaba con secundaria  
incompleta o completa

**85.7%**  
contaba con Seguro  
Popular

**85.7%** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**14.3%** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**85.7%** contó con asistencia médica

**100%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**57.1%**  
murió por otras causas  
obstétricas indirectas

**28.6%**  
por hemorragia del  
embarazo, parto y  
puerperio

**14.3%**  
por complicaciones  
venosas en el embarazo,  
parto y puerperio

**57.1%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**14.3%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**28.6%** tuvo de una a dos consultas prenatales

**71.4%** recibió atención de un médico durante el parto

**57.1%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\*Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 26.5

# BAJA CALIFORNIA

24 muertes en 2013 | RMM: 42.3\*



**16.7%**  
era menor de 19 años

**75.0%**  
vivía en unión libre o era casada

**75.0%**  
se dedicaba al hogar

**41.7%** contaba con primaria incompleta o completa

**4.2%**

**50.0%**

**37.5%** contaba con secundaria incompleta o completa

no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

contaba con Seguro Popular

**41.7%** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**41.7%** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**83.3%** contó con asistencia médica

**95.8%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**37.5%**  
murió por causas obstétricas indirectas

**16.7%**  
por enfermedades hipertensivas del embarazo

**16.7%**  
por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**5.2%**  
por aborto

**33.3%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**50.0%** recibió atención de un médico durante el parto

**16.7%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**25.0%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 41.3.

# BAJA CALIFORNIA SUR

4 muertes en 2013 | RMM: 32.1\*



**25.0%**  
era menor de 19 años

**75.0%**  
vivía en unión libre o  
era casada

**50.0%**  
se dedicaba al hogar

**25.0%** contaba con primaria  
incompleta o completa

**50.0%** contaba con bachillerato o  
preparatoria incompleta o  
completa

**75.0%**  
contaba con Seguro  
Popular

**25.0%**  
contaba con seguro en  
salud del IMSS, ISSSTE,  
PEMEX, SEDENA o  
SEMAR

**75.0%** murió en una clínica u hos-  
pital del servicio federal o  
estatal de salud

**25.0%** en una clínica u hospital de los  
servicios de salud de las institu-  
ciones de seguridad social

**100%** contó con asistencia  
médica

**100%** de los casos tuvo certificado otorgado  
por un médico

**25.0%**  
murió por otras causas  
obstétricas indirectas

**50.0%**  
por enfermedades  
hipertensivas del  
embarazo

**25.0%**  
por hemorragia del  
embarazo, parto  
y puerperio

**50.0%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**100%** recibió atención de un médico durante el parto

**50.0%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**50.0%** atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 33.0.

# CAMPECHE

11 muertes en 2013 | RMM: 65.4\*



**36.4%**  
tenía entre 19 y 24 años

**72.7%**  
vivía en unión libre o era casada

**72.7%**  
se dedicaba al hogar

**45.5%** contaba con secundaria incompleta o completa

**36.4%** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

**18.2%** contaba con estudios profesionales

**72.7%**  
contaba con Seguro Popular

**81.8%** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**18.2%** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**100%** contó con asistencia médica

**100%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**45.5%**  
murió por causas obstétricas indirectas

**18.2%**  
por enfermedades hipertensivas del embarazo

**18.2%**  
por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

**9.1%**  
por aborto

**9.1%** no tuvo control prenatal durante el embarazo

**45.5%** recibió atención de un médico durante el parto

**18.2%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**45.5%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 66.8.



# COAHUILA

16 muertes en 2013 | RMM: 27\*



**12.5%**  
era menor de 19 años

**81.3%**  
vivía en unión libre o era casada

**62.5%**  
se dedicaba al hogar

**18.8%** contaba con primaria incompleta o completa

**56.3%** contaba con secundaria incompleta o completa

**31.3%**  
contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

**62.5%**  
contaba con Seguro Popular

**62.5%** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**25.0%** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**6.3%** en su casa

**87.5%**  
contó con asistencia médica

**100%**  
de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**37.5%**  
murió por enfermedades hipertensivas del embarazo

**25.0%**  
por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**25.0%**  
por causas obstétricas indirectas

**12.5%**  
por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

**12.5%** no tuvo control prenatal durante el embarazo

**6.3%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**12.5%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**81.3%**  
recibió atención de un médico durante el parto

**56.3%**  
atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 29.6.

# COLIMA

3 muertes en 2013 | RMM: 22.5\*



**33.3%**  
era menor de 19 años

**100%**  
vivía en unión libre o  
era casada

**100%**  
se dedicaba al hogar

**33.3%** no tenía escolaridad

**66.7%** contaba con primaria  
incompleta o completa

**100%**  
contaba con Seguro  
Popular

**100%**  
murió en una clínica u  
hospital del servicio fe-  
deral o estatal de salud

**100%** contó con asistencia médica

**66.7%** de los casos tuvo certificado  
otorgado por un médico

**66.7%** murió por causas  
obstétricas indirectas

**33.3%** por enfermedades  
hipertensivas del embarazo

**66.7%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**66.7%** tuvo más de cinco consultas prenatales

**100%**  
recibió atención de un médico  
durante el parto

**100%**  
atendió el parto en una clínica u  
hospital del servicio federal o  
estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 22.4.

# CHIAPAS

62 muertes en 2013 | RMM: 54.8\*



**9.7%**

era menor de  
19 años

**88.7%**

vivía en unión  
libre o era casada

**41.9%**

era hablante de  
lengua indígena

**87.1%**

se dedicaba al  
hogar

**19.4%**

no tenía escolaridad

**32.3%**

contaba con primaria  
incompleta o completa

**27.4%**

contaba con secundaria  
incompleta o completa

**4.8%** no estaba afiliada a algún servicio  
de salud público o privado

**53.2%** murió en una clínica u hospital del  
servicio federal o estatal de salud

**56.5%** contaba con Seguro Popular

**22.6%** en su casa

**22.6%** contaba con IMSS-Oportunidades

**14.5%** en una clínica u hospital de los servi-  
cios de salud de las instituciones de  
seguridad social

**72.6%** contó con asistencia médica

**90.3%** de los casos tuvo certificado  
otorgado por un médico

**24.2%** murió por causas obstétricas  
indirectas

**24.2%** no tuvo control prenatal durante el  
embarazo

**24.2%** por hemorragia del embarazo,  
parto y puerperio

**29.0%** inició el cuidado prenatal entre el  
primer y tercer meses del embarazo

**19.4%** por enfermedades hipertensi-  
vas del embarazo

**29.0%** tuvo entre tres y cinco consultas  
prenatales

**8.1%** por aborto

**64.5%** recibió atención de un  
médico durante el parto

**53.2%** atendió el parto en una clínica u hospital del  
servicio federal o estatal de salud

**12.9%** recibió atención de una  
partera

**16.1%** atendió el parto en su casa

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 54.7.

# CHIHUAHUA

41 muertes en 2013 | RMM: 59.8\*



**2.4%**

tenía entre 10 y 14 años de edad

**78.1%**

vivía en unión libre o era casada

**26.8%**

era hablante de lengua indígena

**73.2%**

se dedicaba al hogar

**24.4%** no tenía escolaridad

**19.5%** contaba con secundaria incompleta o completa

**26.8%** contaba con primaria incompleta o completa

**12.2%** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

**26.8%** no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**43.9%** contaba con Seguro Popular

**29.3%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**24.4%**

en una unidad médica privada

**14.6%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**78.1%** contó con asistencia médica

**92.7%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**24.4%** murió por causas obstétricas indirectas

**14.6%**

no tuvo control prenatal durante el embarazo

**24.4%**

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**2.4%**

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**2.4%** por aborto

**34.2%** por enfermedades hipertensivas del embarazo

**22.0%** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**48.8%** recibió atención de un médico durante el parto

**22.0%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**17.1%** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

**7.3%** atendió el parto en su casa

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 59.6.

# DISTRITO FEDERAL

57 muertes en 2013 | RMM: 41.9\*



8.8%

era menor de 19 años

64.9%

vivía en unión libre o era casada

64.9%

se dedicaba al hogar

35.1%

contaba con secundaria incompleta o completa

33.3%

contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

14.0%

contaba con estudios profesionales

26.3%

no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

45.6%

contaba con Seguro Popular

66.7%

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

14.0%

en una unidad médica privada

10.5%

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

96.5%

contó con asistencia médica

96.5%

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

26.3%

murió por causas obstétricas indirectas

24.6%

por enfermedades hipertensivas del embarazo

15.8%

por aborto

12.3%

por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

3.5%

no tuvo control prenatal durante el embarazo

43.9%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

19.3%

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

61.4%

recibió atención de un médico durante el parto

33.3%

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 43.3.

# DURANGO

15 muertes en 2013 | RMM: 41.2\*



**13.3%**

tenía entre 10 y 14 años de edad

**93.3%**

vivía en unión libre o era casada

**6.7%**

era hablante de lengua indígena

**53.3%**

se dedicaba al hogar

**26.7%** contaba con primaria incompleta o completa

**40.0%** contaba con secundaria incompleta o completa

**26.7%** contaba con estudios profesionales

**33.3%** contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

**53.3%** contaba con Seguro Popular

**6.7%** contaba con IMSS-Oportunidades

**46.7%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**26.7%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**6.7%**

en su casa

**80.0%** contó con asistencia médica

**93.3%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**33.3%** murió por causas obstétricas indirectas

**20.0%** por enfermedades hipertensivas del embarazo

**20.0%** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**13.3%** por aborto

**13.3%** no tuvo control prenatal durante el embarazo

**26.7%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**6.7%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**53.3%** recibió atención de un médico durante el parto

**26.7%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 44.6.

# GUANAJUATO

41 muertes en 2013 | RMM: 34.9\*



**7.3%**  
era menor de 19 años

**75.6%**  
vivía en unión libre o era casada

**70.7%**  
se dedicaba al hogar

**36.6%**  
contaba con primaria incompleta o completa

**36.6%**  
contaba con secundaria incompleta o completa

**17.1%**  
contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

**4.9%** no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado  
**63.4%** contaba con Seguro Popular

**75.6%** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud  
**9.8%** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social  
**2.4%** en una unidad médica privada

**92.7%** contó con asistencia médica  
**100%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**29.3%** murió por causas obstétricas indirectas  
**26.8%** por enfermedades hipertensivas del embarazo  
**14.6%** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio  
**7.3%** por aborto

**17.1%** no tuvo control prenatal durante el embarazo  
**41.5%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo  
**14.6%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**65.9%** recibió atención de un médico durante el parto

**53.7%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 35.7.

# GUERRERO

44 muertes en 2013 | RMM: 59.4\*



**9.1%**

era menor de 19 años

**79.6%**

vivía en unión libre o era casada

**31.8%**

era hablante de lengua indígena

**72.7%**

se dedicaba al hogar

**18.2%** no tenía escolaridad

**43.2%** contaba con primaria incompleta o completa

**6.8%** no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**72.7%** contaba con Seguro Popular

**59.1%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**20.5%**

en su casa

**4.6%**

en una unidad médica privada

**72.7%** contó con asistencia médica

**100%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**25.0%** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**29.6%** por enfermedades hipertensivas del embarazo

**18.2%** por causas obstétricas indirectas

**2.3%** por aborto

**56.8%** recibió atención de un médico durante el parto

**9.1%** recibió atención de una partera

**13.6%** recibió atención de un pariente o familiar

**52.3%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**20.5%** atendió el parto en su casa

**15.9%**

no tuvo control prenatal durante el embarazo

**43.2%**

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**31.8%**

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales


\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 59.3.



# HIDALGO

21 muertes en 2013 | RMM: 37.5\*



**9.5%**

era menor de 19 años

**71.4%**

vivía en unión libre o era casada

**23.8%**

era hablante de lengua indígena

**61.9%**

se dedicaba al hogar

**28.6%** contaba con primaria incompleta o completa

**28.6%** contaba con secundaria incompleta o completa

**23.8%** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

**52.4%** contaba con Seguro Popular

**19.1%** contaba con IMSS-Oportunidades

**19.1%** no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**61.9%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**19.1%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**9.5%**

en una unidad médica privada

**9.5%**

en su casa

**90.5%** contó con asistencia médica

**95.2%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**23.8%** murió por causas obstétricas indirectas

**19.1%** por enfermedades hipertensivas del embarazo

**19.1%** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

**14.3%** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**14.3%** por aborto

**9.5%**

no tuvo control prenatal durante el embarazo

**28.6%**

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**4.8%**

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**57.1%** recibió atención de un médico durante el parto

**4.8%** recibió atención de una partera

**47.6%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**9.5%** atendió el parto en una unidad médica privada

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 37.7.

# JALISCO

34 muertes en 2013 | RMM: 22.4\*



**8.8%**  
era menor de 19 años

**85.3%**  
vivía en unión libre o era casada

**67.7%**  
se dedicaba al hogar

**17.7%**  
contaba con primaria incompleta o completa

**50.0%**  
contaba con secundaria incompleta o completa

**20.6%**  
contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

**5.9%** no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado  
**38.2%** contaba con Seguro Popular  
**38.2%** contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

**52.9%** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**32.4%** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**2.9%** en su casa

**88.2%** contó con asistencia médica

**100%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**29.4%** murió por causas obstétricas indirectas

**17.7%** por enfermedades hipertensivas del embarazo

**23.5%** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**14.7%** por aborto

**8.8%** no tuvo control prenatal durante el embarazo

**41.2%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**23.5%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**79.4%**  
recibió atención de un médico durante el parto

**2.9%**  
recibió atención de una partera

**52.9%**  
atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**23.5%**  
atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 22.8.

# MÉXICO

107 muertes en 2013 | RMM: 36.1



**7.5%**

era menor de 19 años

**81.3%**

vivía en unión libre o era casada

**3.7%**

era hablante de lengua indígena

**72.0%**

se dedicaba al hogar

**22.4%**

contaba con primaria incompleta o completa

**43.0%**

contaba con secundaria incompleta o completa

**17.8%**

contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

**25.2%**

no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**39.3%**

contaba con Seguro Popular

**65.4%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**5.6%**

en su casa

**9.4%**

en una unidad médica privada

**18.7%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**93.5%** contó con asistencia médica

**99.1%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**25.2%** murió por causas obstétricas indirectas

**11.2%** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

**24.3%** por enfermedades hipertensivas del embarazo

**15.9%** por aborto

**16.8%** no tuvo control prenatal durante el embarazo

**63.6%** recibió atención de un médico durante el parto

**25.2%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**0.9%** recibió atención de un pariente o familiar

**18.7%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**44.9%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 34.8.

# MICHOACÁN

35 muertes en 2013 | RMM: 36.7



**2.9%**

tenía entre 10 y 14 años de edad

**82.9%**

vivía en unión libre o era casada

**2.9%**

era hablante de lengua indígena

**88.6%**

se dedicaba al hogar

**48.6%** contaba con primaria incompleta o completa

**2.9%** no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**20.0%** contaba con secundaria incompleta o completa

**62.9%** contaba con Seguro Popular

**25.7%** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

**8.6%** contaba con IMSS-Oportunidades

**54.3%** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**22.9%** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**8.6%** en una unidad médica privada

**5.7%** en su casa

**2.9%** en la vía pública

**94.3%** contó con asistencia médica

**100%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**37.1%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo

**25.7%** por causas obstétricas indirectas

**14.3%** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**8.6%** por aborto

**5.7%** no tuvo control prenatal durante el embarazo

**54.3%** recibió atención de un médico durante el parto

**37.1%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**20.0%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**11.4%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**17.1%** atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**14.3%** atendió el parto en una unidad médica privada

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 38.7.

# MORELOS

15 muertes en 2013 | RMM: 44.5\*



**33.3%**

tenía entre 19 y 24 años

**86.7%**

vivía en unión libre o era casada

**6.7%**

era hablante de lengua indígena

**80.0%**

se dedicaba al hogar

**20.0%** contaba con primaria incompleta o completa

**40.0%** contaba con secundaria incompleta o completa

**20.0%** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

**13.3%** no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**80.0%** contaba con Seguro Popular

**66.7%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**13.3%**

en su casa

**13.3%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**6.7%**

en una unidad médica privada

**93.3%** contó con asistencia médica

**100%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**20.0%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo

**46.7%** por causas obstétricas indirectas

**6.7%** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**6.7%** por aborto

**26.7%** no tuvo control prenatal durante el embarazo

**33.3%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**6.7%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**66.7%** recibió atención de un médico durante el parto

**60.0%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 43.3

# NAYARIT

8 muertes en 2013 | RMM: 36.1\*



**25.0%**

tenía entre 19 y 24 años

**62.5%**

vivía en unión libre o era casada

**25.0%**

era hablante de lengua indígena

**37.5%**

se dedicaba al hogar

**37.5%** contaba con primaria incompleta o completa

**37.5%** contaba con secundaria incompleta o completa

**12.5%** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

**37.5%**

contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

**62.5%**

contaba con Seguro Popular

**12.5%**

murió en su casa

**50.0%**

en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**25.0%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**75.0%** contó con asistencia médica

**100%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**50.0%** murió por causas obstétricas indirectas

**25.0%** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**12.5%** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

**12.5%** por otras complicaciones, principalmente puerperales

**12.5%**

no tuvo control prenatal durante el embarazo

**62.5%**

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**25.0%**

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**50.0%** recibió atención de un médico durante el parto

**25.0%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**12.5%** atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 36.5.

# NUEVO LEÓN

13 muertes en 2013 | RMM: 14.8\*



**38.5%**  
tenía entre 25 y 29 años

**92.3%**  
vivía en unión libre o era casada

**76.9%**  
se dedicaba al hogar

**7.7%**  
contaba con primaria incompleta o completa

**69.2%**  
contaba con secundaria incompleta o completa

**15.4%**  
contaba con estudios profesionales

**46.2%** contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

**30.8%** contaba con Seguro Popular  
**7.7%** no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**30.8%**  
murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**30.8%**  
en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**15.4%**  
en una unidad médica privada

**15.4%**  
en el hogar

**76.9%** contó con asistencia médica

**92.3%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**30.8%** murió por causas obstétricas indirectas

**30.8%** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**7.7%** por enfermedades hipertensivas del embarazo

**7.7%** por aborto

**7.7%**  
no tuvo control prenatal durante el embarazo

**46.2%**  
inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**15.4%**  
tuvo de una a dos consultas prenatales

**53.9%** recibió atención de un médico durante el parto

**15.4%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**38.5%** atendió el parto en una unidad médica privada

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 15.2.

# OAXACA

41 muertes en 2013 | RMM: 50.4\*



**9.8%**

era menor de 19 años

**78.1%**

vivía en unión libre o era casada

**29.3%**

era hablante de lengua indígena

**75.6%**

se dedicaba al hogar

**43.9%**

contaba con primaria incompleta o completa

**17.1%**

contaba con secundaria incompleta o completa

**22.0%**

contaba con preparatoria o bachillerato incompleto o completo

**19.5%**

no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**41.5%**

contaba con Seguro Popular

**24.4%**

contaba con IMSS-Oportunidades

**58.5%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**24.4%**

en su casa

**9.8%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**70.7%**

contó con asistencia médica

**90.2%**

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**34.2%**

murió por causas obstétricas indirectas

**22.0%**

por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**22.0%**

por enfermedades hipertensivas del embarazo

**2.4%**

por aborto

**51.2%**

recibió atención de un médico durante el parto

**9.8%**

recibió atención de una partera

**39.0%**

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**14.6%**

atendió el parto en su casa

**9.8%**

no tuvo control prenatal durante el embarazo

**48.8%**

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**22.0%**

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 50.2.



# PUEBLA

40 muertes en 2013 | RMM: 31.8\*



**10.0%**

era menor de 19 años

**87.5%**

vivía en unión libre o era casada

**7.5%**

era hablante de lengua indígena

**67.5%**

se dedicaba al hogar

**32.5%**

contaba con primaria incompleta o completa

**17.5%**

contaba con secundaria incompleta o completa

**30.0%**

contaba con preparatoria o bachillerato incompleto o completo

**15.0%**

no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**45.0%**

contaba con Seguro Popular

**15.0%**

contaba con IMSS-Oportunidades

**52.5%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**25.0%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**15.0%**

en una unidad médica privada

**87.5%**

contó con asistencia médica

**95.5%**

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**32.5%**

murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**15.0%**

por enfermedades hipertensivas del embarazo

**15.0%**

por causas obstétricas indirectas

**10.0%**

por aborto

**82.5%**

recibió atención de un médico durante el parto

**2.5%**

recibió atención de una partera

**30.0%**

atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**32.5%**

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**20.0%**

atendió el parto en una unidad médica privada

**10.0%**

no tuvo control prenatal durante el embarazo

**45.0%**

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**22.5%**

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 31.2.

# QUERÉTARO

14 muertes en 2013 | RMM: 35.0\*



**21.4%**  
era menor de 19 años

**57.1%**  
vivía en unión libre o era casada

**57.1%**  
se dedicaba al hogar

**14.3%**  
contaba con primaria incompleta o completa

**35.7%**  
contaba con secundaria incompleta o completa

**28.6%**  
contaba con preparatoria o bachillerato incompleto o completo

**50.0%** contaba con Seguro Popular

**50.0%** contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

**42.9%** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**35.7%** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**85.7%** contó con asistencia médica

**100%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**42.9%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo

**28.6%** por causas obstétricas indirectas

**7.1%**  
no tuvo control prenatal durante el embarazo

**57.1%**  
inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**14.3%**  
tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**64.3%** recibió atención de un médico durante el parto

**35.7%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 37.1.

# QUINTANA ROO

13 muertes en 2013 | RMM: 46.2\*



**38.5%**  
era menor de 19 años

**92.3%**  
vivía en unión libre o  
era casada

**76.9%**  
se dedicaba al hogar

**7.7%** contaba con primaria  
incompleta o completa

**30.8%** contaba con preparatoria o bachillerato  
incompleto o completo

**23.1%** contaba con secundaria  
incompleta o completa

**15.4%** contaba con estudios profesionales

**38.5%** contaba con seguro en salud del IMSS,  
ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

**38.5%** contaba con Seguro Popular

**30.8%**  
murió en una clínica u hospital del  
servicio federal o estatal de salud

**38.5%**  
en una clínica u hospital de los servi-  
cios de salud de las instituciones de  
seguridad social

**7.7%**  
en el hogar

**92.3%** contó con asistencia médica

**84.6%** de los casos tuvo certificado  
otorgado por un médico

**30.8%** murió por enfermedades  
hipertensivas del embarazo

**7.7%** no tuvo control prenatal  
durante el embarazo

**23.1%** por causas obstétricas indirectas

**7.7%** inició el cuidado prenatal entre  
el primer y tercer meses del  
embarazo

**23.1%** por otras complicaciones,  
principalmente del embarazo y parto

**7.7%** tuvo entre tres y cinco  
consultas prenatales

**15.4%** por aborto

**76.9%** recibió atención de un  
médico durante el parto

**38.5%** atendió el parto en una clínica u hospital del  
servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 46.2.

# SAN LUIS POTOSÍ

17 muertes en 2013 | RMM: 31.8\*



**52.9%**

tenía entre 19 y 24 años

**82.4%**

vivía en unión libre o era casada

**17.7%**

era hablante de lengua indígena

**64.7%**

se dedicaba al hogar

**29.4%**

contaba con primaria incompleta o completa

**41.2%**

contaba con secundaria incompleta o completa

**17.7%**

contaba con preparatoria o bachillerato incompleto o completo

**5.9%**

no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**58.8%**

contaba con Seguro Popular

**58.8%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**17.7%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**11.8%**

en una unidad médica privada

**11.8%**

en el hogar

**88.2%** contó con asistencia médica

**100%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**35.3%** murió por causas obstétricas indirectas

**23.5%** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

**17.7%** por aborto

**5.9%** por enfermedades hipertensivas del embarazo

**5.9%**

no tuvo control prenatal durante el embarazo

**23.5%**

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**23.5%**

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**64.7%**

recibió atención de un médico durante el parto

**41.2%**

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 31.6.

# SINALOA

14 muertes en 2013 | RMM: 26.7\*



**14.3%**

era menor de 19 años

**85.7%**

vivía en unión libre o era casada

**7.1%**

era hablante de lengua indígena

**57.1%**

se dedicaba al hogar

**35.7%** contaba con primaria incompleta o completa

**35.7%** contaba con secundaria incompleta o completa

**21.4%** contaba con estudios profesionales

**7.1%** no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**50.0%** contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

**35.7%** contaba con Seguro Popular

**7.1%** contaba con IMSS-Oportunidades

**42.9%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**50.0%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**7.1%**

en una unidad médica privada

**100%** contó con asistencia médica

**100%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**35.7%** murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**21.4%** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

**21.4%** por enfermedades hipertensivas del embarazo

**14.3%** por causas obstétricas indirectas

**7.1%** por aborto

**50.0%**

no tuvo control prenatal durante el embarazo

**14.3%**

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**14.3%**

tuvo más de cinco consultas prenatales

**71.4%** recibió atención de un médico durante el parto

**21.4%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 25.7.

# SONORA

21 muertes en 2013 | RMM: 40.2\*



**28.6%**

tenía entre 19 y 24 años

**57.1%**

vivía en unión libre o era casada

**4.8%**

era hablante de lengua indígena

**76.2%**

se dedicaba al hogar

**42.9%** contaba con secundaria incompleta o completa

**19.1%** contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

**19.1%** no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**66.7%** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**52.4%** contaba con Seguro Popular

**19.1%** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**28.6%** contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

**9.5%** en una unidad médica privada

**100%** contó con asistencia médica

**100%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**38.1%**

murió por enfermedades hipertensivas del embarazo

**19.1%**

por causas obstétricas indirectas

**19.1%**

por aborto

**19.1%**

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**14.3%**

no tuvo control prenatal durante el embarazo

**9.5%**

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**95.2%** recibió atención de un médico durante el parto

**57.1%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 39.9.

# TABASCO

14 muertes en 2013 | RMM: 27.4\*



**14.3%**

era menor de 19 años

**78.6%**

vivía en unión libre o era casada

**7.1%**

era hablante de lengua indígena

**85.7%**

se dedicaba al hogar

**21.4%**

contaba con primaria incompleta o completa

**35.7%**

contaba con secundaria incompleta o completa

**28.6%**

contaba con preparatoria o bachillerato incompleto o completo

**7.1%**

no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**57.1%**

contaba con Seguro Popular

**92.9%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**7.1%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**92.9%**

contó con asistencia médica

**92.9%**

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**35.7%** murió por causas obstétricas indirectas

**21.4%** por enfermedades hipertensivas del embarazo

**14.3%** por aborto

**14.3%** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**21.4%**

no tuvo control prenatal durante el embarazo

**42.9%**

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**28.6%**

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**71.4%**

recibió atención de un médico durante el parto

**64.3%**

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 30.2.

# TAMAULIPAS

25 muertes en 2013 | RMM: 41.7\*



**4.0%**  
tenía entre 10 y 14 años de edad

**76.0%**  
vivía en unión libre o era casada

**48.0%**  
se dedicaba al hogar

**20.0%**  
contaba con primaria incompleta o completa

**32.0%**  
contaba con secundaria incompleta o completa

**32.0%**  
contaba con preparatoria o bachillerato incompleto o completo

**8.0%** no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**28.0%** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**32.0%** contaba con Seguro Popular

**40.0%** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**4.0%** contaba con IMSS-Oportunidades

**12.0%** en una unidad médica privada

**88.0%** contó con asistencia médica

**96.0%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**28.0%**  
murió por causas obstétricas indirectas

**32.0%**  
por enfermedades hipertensivas del embarazo

**16.0%**  
por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**16.0%** no tuvo control prenatal durante el embarazo

**32.0%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**64.0%** recibió atención de un médico durante el parto

**8.0%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**32.0%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**36.0%** tuvo más de cinco consultas prenatales

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 40.0.



# TLAXCALA

6 muertes en 2013 | RMM: 23.2\*



**33.3%**

tenía entre 19 y 24 años

**83.3%**

vivía en unión libre o era casada

**50.0%**

se dedicaba al hogar

**16.7%**

contaba con secundaria incompleta o completa

**16.7%**

contaba con preparatoria o bachillerato incompleto o completo

**66.7%**

contaba con estudios profesionales

**33.3%**

no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**16.7%**

contaba con Seguro Popular

**33.3%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**83.3%**

contó con asistencia médica

**33.3%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**100%**

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**16.7%**

en su casa

**50.0%**

murió por causas obstétricas indirectas

**33.3%**

por aborto

**16.7%**

por enfermedades hipertensivas del embarazo

**33.3%**

no tuvo control prenatal durante el embarazo

**66.7%**

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**33.3%**

recibió atención de un médico durante el parto

**16.7%**

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**33.3%**

atendió el parto en una unidad médica privada

**50.0%**

tuvo más de cinco consultas prenatales

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 23.7.

# VERACRUZ

64 muertes en 2013 | RMM: 46.4



**15.6%**

era menor de 19 años

**78.1%**

vivía en unión libre o era casada

**4.7%**

era hablante de lengua indígena

**89.1%**

se dedicaba al hogar

**35.9%** contaba con primaria incompleta o completa

**21.9%** contaba con secundaria incompleta o completa

**28.1%** contaba con preparatoria o bachillerato incompleto o completo

**12.5%** no estaba afiliada a algún servicio de salud público o privado

**60.9%** contaba con Seguro Popular

**7.8%** contaba con IMSS-Oportunidades

**67.2%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**12.5%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**7.8%**

en una unidad médica privada

**9.4%**

en su casa

**84.4%** contó con asistencia médica

**98.4%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**32.8%** murió por causas obstétricas indirectas

**18.8%** por enfermedades hipertensivas del embarazo

**21.9%** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**6.3%** por aborto

**10.9%** no tuvo control prenatal durante el embarazo

**32.8%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**15.6%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**26.6%** tuvo más de cinco consultas prenatales

**68.8%** recibió atención de un médico durante el parto

**6.3%** recibió atención de una partera

**43.8%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**7.8%** atendió el parto en su casa

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 45.2.

# YUCATÁN

20 muertes en 2013 | RMM: 50.8\*



**25.0%**

era menor de  
19 años

**90.0%**

vivía en unión  
libre o era casada

**20.0%**

era hablante de  
lengua indígena

**80.0%**

se dedicaba al  
hogar

**25.0%**

contaba con primaria incompleta o completa

**15.0%**

contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

**45.0%**

contaba con secundaria incompleta o completa

**65.0%**

contaba con Seguro Popular

**20.0%**

contaba con estudios profesionales

**15.0%**

con IMSS-Oportunidades

**65.0%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**15.0%**

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**15.0%**

en el hogar

**85.0%** contó con asistencia médica

**90.0%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**35.0%**

murió por enfermedades hipertensivas del embarazo

**10.0%**

no tuvo control prenatal durante el embarazo

**35.0%**

por causas obstétricas indirectas

**10.0%**

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**15.0%**

por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

**5.0%**

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**5.0%**

por aborto

**20.0%**

tuvo más de cinco consultas prenatales

**60.0%**

recibió atención de un médico durante el parto

**45.0%**

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 50.4.

# ZACATECAS

14 muertes en 2013 | RMM: 44.2\*



**28.6%**  
tenía entre 19 y 24 años

**92.9%**  
vivía en unión libre o era casada

**100%**  
se dedicaba al hogar

**21.4%**  
contaba con primaria incompleta o completa

**42.9%**  
contaba con secundaria incompleta o completa

**35.7%**  
contaba con preparatoria o bachillerato incompleto o completo

**21.4%** contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

**42.9%** contaba con Seguro Popular

**7.1%** contaba con IMSS-Oportunidades

**50.0%** murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**14.3%** en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

**50.0%** contó con asistencia médica

**100%** de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**35.7%** murió por causas obstétricas indirectas

**14.3%** por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**7.1%** por enfermedades hipertensivas del embarazo

**21.4%** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

**57.1%** tuvo más de cinco consultas prenatales

**64.3%** inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**14.3%** tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**64.3%** recibió atención de un médico durante el parto

**28.6%** atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

\* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 44.8.

---

**POR TIPO DE  
AFILIACIÓN EN  
SALUD**

---



# NO AFILIADAS A ALGÚN SERVICIO DE SALUD

109 muertes en 2013

<p><b>48.6%</b> murió en el Estado de México, el Distrito Federal y Chihuahua</p>	<p><b>6.4%</b> era menor de 19 años</p>	<p><b>13.8%</b> era hablante de lengua indígena</p>	<p><b>78.0%</b> vivía en unión libre o era casada</p>	<p><b>78.9%</b> se dedicaba al hogar</p>
<p><b>33.0%</b> contaba con primaria incompleta o completa</p>		<p><b>23.9%</b> tenía secundaria incompleta o completa</p>		
<p><b>50.0%</b> murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</p>	<p><b>24.8%</b> en una unidad médica privada</p>		<p><b>15.6%</b> en la vía pública</p>	
<p><b>78.9%</b> contó con asistencia médica</p>		<p><b>96.3%</b> de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>		
<p><b>24.8%</b> murió por causas obstétricas indirectas</p>	<p><b>16.5%</b> no tuvo control prenatal durante el embarazo</p>	<p><b>27.5%</b> inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p>	<p><b>14.7%</b> tuvo entre tres y cinco consultas prenatales</p>	
<p><b>19.3%</b> por hemorragia del embarazo, parto y puerperio</p>	<p><b>55.0%</b> recibió atención de un médico durante el parto</p>			
<p><b>13.8%</b> por aborto</p>	<p><b>4.6%</b> recibió atención de una partera</p>			
<p><b>12.8%</b> por enfermedades hipertensivas del embarazo</p>	<p><b>24.8%</b> atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</p>			

# AFILIADAS AL IMSS

154 muertes en 2013

35.1%

murió en el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas y Baja California

7.8%

era menor de 19 años

0.6%

era hablante de lengua indígena

81.2%

vivía en unión libre o era casada

48.7%

se dedicaba al hogar

29.9%

tenía secundaria incompleta o completa

26.0%

tenía bachillerato o preparatoria incompleta o completa

73.4%

murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

6.5%

en una unidad médica privada

7.8%

en la vía pública

87.7%

contó con asistencia médica

99.4%

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

35.7%

murió por causas obstétricas indirectas

24.7%

por enfermedades hipertensivas del embarazo

13.6%

por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

11.0%

por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

9.1%

por aborto

7.8%

no tuvo control prenatal durante el embarazo

33.1%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

11.7%

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

66.2%

recibió atención de un médico durante el parto

48.7%

atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social



# AFILIADAS AL ISSSTE

26 muertes en 2013

46.2%

murió en el Distrito Federal, el Estado de México y San Luis Potosí

7.7%

era menor de 19 años

7.7%

era hablante de lengua indígena

65.4%

vivía en unión libre o era casada

30.8%

se dedicaba al hogar

23.1% tenía secundaria incompleta o completa

50.0% contaba con estudios profesionales

73.1%

murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

11.5%

en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

15.4%

en una unidad médica privada

92.3% contó con asistencia médica

100% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

26.9% murió por enfermedades hipertensivas del embarazo

11.5%

no tuvo control prenatal durante el embarazo

30.8%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

19.2%

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

19.2% por causas obstétricas indirectas

19.2% por aborto

69.2%

recibió atención de un médico durante el parto

15.4% por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

34.6%

atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

# AFILIADAS AL SEGURO POPULAR

444 muertes en 2013

**33.3%**

murió en Chiapas, Guerrero, el Estado de México y Veracruz

**12.4%**

era menor de 19 años

**11.9%**

era hablante de lengua indígena

**79.7%**

vivía en unión libre o era casada

**81.5%**

se dedicaba al hogar

**31.3%**

contaba con primaria incompleta o completa

**37.6%**

tenía secundaria incompleta o completa

**82.4%**

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

**8.6%**

en la vía pública

**3.6%**

en una unidad médica privada

**89.0%**

contó con asistencia médica

**96.4%**

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

**27.0%**

murió por causas obstétricas indirectas

**26.4%**

por enfermedades hipertensivas del embarazo

**17.8%**

por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

**13.7%**

por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

**6.8%** por aborto

**14.0%**

no tuvo control prenatal durante el embarazo

**34.5%**

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

**18.0%**

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

**66.0%**

recibió atención de un médico durante el parto

**59.7%**

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

# AFILIADAS AL IMSS-OPORTUNIDADES

50 muertes en 2013

60.0%	16.0%	4.3%	86.0%	88.0%
murió en Chiapas, Oaxaca y Puebla	era menor de 19 años	era hablante de lengua indígena	vivía en unión libre o era casada	se dedicaba al hogar
16.0%	no contaba con escolaridad o sólo con preescolar	40.0%	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	
38.0%	contaba con primaria incompleta o completa	20.0%	en la vía pública	
24.0%	tenía secundaria incompleta o completa	4.0%	en una unidad médica privada	
80.0%	contó con asistencia médica	92.0%	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico	
28.0%	murió por causas obstétricas indirectas	10.0%	54.0%	26.0%
22.0%	por enfermedades hipertensivas del embarazo	no tuvo control prenatal durante el embarazo	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
22.0%	por hemorragia del embarazo, parto y puerperio	64.0%	recibió atención de un médico durante el parto	
12.0%	por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto	8.0%	recibió atención de una partera	
10.0%	por aborto	36.0%	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	

# AFILIADAS A PEMEX, SEDENA O SEMAR

5 muertes en 2013

100.0%

murió en Puebla,  
Guerrero, Guanajuato  
y Tabasco

40.0%

tenía entre 25 y  
29 años

60.0%

vivía en unión  
libre o era casada

40.0%

se dedicaba al  
hogar

40.0% contaba con secundaria  
incompleta o completa

40.0% era profesionista

40.0%

murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las  
instituciones de seguridad social

100.0% contó con asistencia médica

100.0% de los casos tuvo certificado otorgado  
por un médico

20.0%

murió por enfermeda-  
des hipertensivas del  
embarazo

20.0%

no tuvo control  
prenatal durante  
el embarazo

60.0%

inició el cuidado  
prenatal entre el  
primer y tercer me-  
ses del embarazo

20.0%

tuvo entre tres y  
cinco consultas  
prenatales

60.0%

por hemorragia del  
embarazo, parto y  
puerperio

20.0%

por causas obstétricas  
indirectas

100.0%

recibió atención de un médico durante el  
parto

40.0%

atendió el parto en una clínica u hospital  
de los servicios de salud de las institucio-  
nes de seguridad social

# AFILIADAS A OTRA INSTITUCIÓN DE SALUD

13 muertes en 2013

<p><b>61.5 %</b> murió en el Estado de México, Tabasco y el Distrito Federal</p>	<p><b>7.7%</b> era menor de 19 años</p>	<p><b>84.6%</b> vivía en unión libre o era casada</p>	<p><b>30.8%</b> se dedicaba al hogar</p>
<p><b>23.1%</b> tenía bachillerato o preparatoria incompleta o completa</p>		<p><b>38.5%</b> era profesionista</p>	
<p><b>69.2%</b> murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</p>	<p><b>23.1%</b> en una unidad médica privada</p>	<p><b>7.7%</b> en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social</p>	
<p><b>100%</b> contó con asistencia médica</p>		<p><b>92.3%</b> de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>	
<p><b>23.1%</b> murió por enfermedades hipertensivas del embarazo</p>	<p><b>7.7%</b> no tuvo control prenatal durante el embarazo</p>	<p><b>30.8%</b> inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p>	<p><b>30.8%</b> tuvo entre una y dos consultas prenatales</p>
<p><b>23.1%</b> por causas obstétricas indirectas</p>	<p><b>69.2%</b> recibió atención de un médico durante el parto</p>		
<p><b>15.4%</b> por hemorragia del embarazo, parto y puerperio</p>	<p><b>61.5%</b> atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</p>		
<p><b>15.4%</b> por aborto</p>	<p><b>15.4%</b> atendió el parto en una unidad médica privada</p>		



---

**POR LUGAR  
DE OCURRENCIA DE  
LA DEFUNCIÓN**

---





# SERVICIOS ESTATALES Y FEDERALES DE SALUD

496 muertes en 2013

29.4%

murió en el Estado  
de México,  
Chiapas y Veracruz

12.9%

era menor de  
19 años

10.5%

era hablante de  
lengua indígena

78.4%

vivía en unión  
libre o era casada

80.2%

se dedicaba al  
hogar

28.4%

contaba con primaria  
incompleta o completa

38.9%

contaba con secundaria  
incompleta o completa

20.6%

tenía bachillerato o preparatoria  
incompleta o completa

11.1%

no tenía seguridad social ni  
protección a la salud

73.8%

contaba con Seguro Popular

93.5%

contó con asistencia médica

96.2%

de los casos tuvo certificado otorgado  
por un médico

24.8%

murió por enferme-  
dades hipertensivas  
del embarazo

14.5%

no tuvo control  
prenatal durante  
el embarazo

34.9%

inició el cuidado  
prenatal entre el  
primer y tercer me-  
ses del embarazo

17.3%

tuvo entre tres y  
cinco consultas  
prenatales

30.4%

por causas obstétricas  
indirectas

15.5%

por hemorragia del  
embarazo, parto y  
puerperio

13.7%

por otras complicacio-  
nes, principalmente del  
embarazo y parto

70.0%

recibió atención de un médico durante el  
parto

8.5%

por aborto

62.5%

atendió el parto en una clínica u hospital  
del servicio federal o estatal de salud

# SERVICIOS DE SALUD DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

163 muertes en 2013

<p><b>25.2%</b></p> <p>murió en el Estado de México, Jalisco y Puebla</p>	<p><b>7.4%</b></p> <p>era menor de 19 años</p>	<p><b>5.5%</b></p> <p>era hablante de lengua indígena</p>	<p><b>79.8%</b></p> <p>vivía en unión libre o era casada</p>	<p><b>52.8%</b></p> <p>se dedicaba al hogar</p>
<p><b>27.6 %</b></p> <p>contaba con secundaria incompleta o completa</p>	<p><b>24.5%</b></p> <p>tenía bachillerato o preparatoria incompleta o completa</p>		<p><b>25.2%</b></p> <p>contaba con estudios profesionales</p>	
<p><b>1.2%</b> no tenía seguridad social ni protección a la salud</p> <p><b>69.3%</b> era derechohabiente del IMSS</p> <p><b>3.1%</b> contaba con Seguro Popular</p>	<p><b>95.7%</b> contó con asistencia médica</p> <p><b>99.4%</b> de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>			
<p><b>30.7%</b> murió por causas obstétricas indirectas</p> <p><b>25.8%</b> por enfermedades hipertensivas del embarazo</p> <p><b>13.5%</b> por hemorragia del embarazo, parto y puerperio</p> <p><b>13.5%</b> por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto</p> <p><b>8.0%</b> por aborto</p>	<p><b>7.4%</b></p> <p>no tuvo control prenatal durante el embarazo</p>	<p><b>36.8%</b></p> <p>inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p>	<p><b>12.3%</b></p> <p>tuvo entre tres y cinco consultas prenatales</p>	
<p><b>72.4%</b></p> <p>recibió atención de un médico durante el parto</p>		<p><b>56.4%</b></p> <p>atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social</p>		

# HOSPITALES Y CLÍNICAS PRIVADAS

68 muertes en 2013

50.0%	5.9%	1.5%	94.1%	64.7%
murió en el Estado de México, el Distrito Federal, Chihuahua y Puebla	era menor de 19 años	era hablante de lengua indígena	vivía en unión libre o era casada	se dedicaba al hogar
27.9%	23.5%	26.5%		
contaba con primaria incompleta o completa	tenía bachillerato o preparatoria incompleta o completa	contaba con estudios profesionales		
39.7%	23.5%			
no tenía seguridad social ni protección a la salud	contaba con Seguro Popular			
98.5%	98.5%			
contó con asistencia médica	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico			
14.7%	22.1%	32.4%	11.8%	
murió por causas obstétricas indirectas	no tuvo control prenatal durante el embarazo	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales	
26.5%				
por hemorragia del embarazo, parto y puerperio				
20.6%				
por enfermedades hipertensivas del embarazo				
10.3%				
por otras complicaciones, principalmente puerperales				
19.1%				
por aborto				
	70.6%			
	recibió atención de un médico durante el parto			
	70.6%			
	atendió el parto en una clínica u hospital privado			

# HOGAR

85 muertes en 2013

<p><b>45.9%</b> murió en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México</p>	<p><b>11.8%</b> era menor de 19 años</p>	<p><b>28.2%</b> era hablante de lengua indígena</p>	<p><b>81.2%</b> vivía en unión libre o era casada</p>	<p><b>75.3%</b> se dedicaba al hogar</p>
<p><b>40.0%</b> contaba con primaria incompleta o completa</p>	<p><b>18.8%</b> contaba con secundaria incompleta o completa</p>	<p><b>20.0%</b> tenía bachillerato o preparatoria incompleta o completa</p>		
<p><b>20.0%</b> no tenía seguridad social ni protección a la salud</p>	<p><b>44.7%</b> contaba con Seguro Popular</p>			
<p><b>35.3%</b> contó con asistencia médica</p>	<p><b>92.9%</b> de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>			
<p><b>28.2%</b> murió por causas obstétricas indirectas</p>	<p><b>11.8%</b> no tuvo control prenatal durante el embarazo</p>	<p><b>27.1%</b> inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p>	<p><b>23.5%</b> tuvo entre tres y cinco consultas prenatales</p>	
<p><b>23.5%</b> por hemorragia del embarazo, parto y puerperio</p>				
<p><b>14.1%</b> por otras complicaciones, principalmente puerperales</p>	<p><b>23.5%</b> recibió atención de un médico durante el parto</p>			
<p><b>14.1%</b> por enfermedades hipertensivas del embarazo</p>	<p><b>14.1%</b> recibió atención de una partera</p>			
<p><b>5.9%</b> por aborto</p>	<p><b>16.5%</b> atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</p>			
	<p><b>27.1%</b> atendió el parto en su casa</p>			



Para mayor información consulta nuestra página:

**[www.omm.org.mx](http://www.omm.org.mx)**



o escríbenos a:

**[observatoriomuertematerna@gmail.com](mailto:observatoriomuertematerna@gmail.com)**



y síguenos en *twitter*:

**[@observatoriomm](https://twitter.com/observatoriomm)**



y en *facebook*:

**Omm En México**

Observatorio de Mortalidad Materna en México  
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

**Oficinas en la Ciudad de México:**

Casa Chata: Hidalgo y Matamoros s/n, Col. Tlalpan, Deleg. Tlalpan, México,  
D.F., C.P. 14000, Tel. (01-55) 5487 7100 ext. 1606

**Oficinas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas:**

Carretera a Chamula No. 108, Barrio La Quinta San Martín, C.P. 29247,  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,  
Teléfonos (01 967) 674 7028 y (01 967) 674 5079

---

---

## Observatorio de Mortalidad Materna en México

Freyermuth, G., Luna, M., Muños, J., 2015, *Numeralia 2013. Mortalidad Materna en México*, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), Organización Panamericana de la Salud en México (OPS)/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), México, 62 pp.

Fuente: Elaboración del OMM a partir de la Base de datos definitiva de Mortalidad Materna 2013, Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud, México, 2014.

Validación: María del Pilar Ochoa Torres

Diseño: Julieta Abeyta Torres

Corrección de estilo: Laura E. Martínez B.

Esta publicación contó con el apoyo financiero del CIESAS y de la OPS para su elaboración, y del UNFPA (por sus siglas en inglés) para su reproducción.

El OMM agradece la importante colaboración de la DGIS por la validación realizada a la *Numeralia 2013. Mortalidad Materna en México*.

ISBN: 978-607-96775-0-3

---



Para mayor información consulta nuestra página:

**[www.omm.org.mx](http://www.omm.org.mx)**



o escríbenos a:

**[observatoriomuertematerna@gmail.com](mailto:observatoriomuertematerna@gmail.com)**



y síguenos en *twitter*:

**[@observatoriommm](https://twitter.com/observatoriommm)**



y en *facebook*:

**Omm En México**

ISBN: 978-607-96775-0-3

