



NUMERALIA

2014

MORTALIDAD MATERNA EN MÉXICO

Autoría:
Graciela Freyermuth
Marisol Luna
José A. Muños

Diseño:
Julieta Abeyta

Revisión de cuadros:
Ana Lilia Meneses

Numeralia 2014. Mortalidad Materna en México
2016 Primera edición

Observatorio de Mortalidad Materna en México
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Juárez 87, Col. Tlalpan, C.P. 14000, México DF.

Numeralia 2014. Mortalidad Materna en México by Observatorio de
Mortalidad Materna en México / CIESAS is licensed under a Licencia de
Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 2.5 México

ISBN: 978-607-96775-6-5

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 05

NOTAS TÉCNICAS 07

POR RESIDENCIA HABITUAL
DE LA MUJER 09

POR TIPO DE AFILIACIÓN
EN SALUD 45

POR LUGAR DE OCURRENCIA
DE LA DEFUNCIÓN 55

PRESENTACIÓN

El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) tiene entre sus mandatos crear un sistema de indicadores que permita el análisis, la evaluación, el monitoreo y la vigilancia sistemática de los procesos y resultados de políticas, estrategias, programas y servicios encaminados a reducir la mortalidad materna (MM), así como fijar los mecanismos necesarios que posibiliten y garanticen el acceso a información confiable, oportuna y periódica para el análisis y la prevención de las muertes maternas en México. La publicación de la Numeralia y de los Indicadores que se ha hecho año con año desde el 2010 obedece a dicho mandato.

La Numeralia 2014 brinda una mirada rápida sobre las defunciones maternas ocurridas y registradas durante el 2014 en el país. Esto con el objetivo de sintetizar la información más relevante y los aspectos particulares del comportamiento de la MM de acuerdo con la entidad de residencia habitual, la condición de aseguramiento en salud de la mujer y el lugar de ocurrencia de la defunción; por ello, no pretende que el o la lectora tengan una visión comparable por entidad federativa, por condición de aseguramiento en salud o por lugar de defunción. Sin embargo, la información comparada podrá ser consultada en la publicación de los Indicadores del 2014.

La Numeralia de Mortalidad Materna en México 2014 se elaboró a partir de la información obtenida de la base de datos de mortalidad de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), de la Secretaría de Salud, que año con año es publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), después de ser validada. Se han incluido en esta sistematización los porcentajes de datos socio-demográficos y de acceso a servicios de salud que se consideran de mayor relevancia, con la finalidad de que quienes estén interesados en esta problemática tengan acceso a información desagregada por cada estado de la República Mexicana. Asimismo, para ayudar a dimensionar el problema de la MM en cada entidad federativa, se ha incluido la Razón de Mortalidad Materna (RMM), definida como el

número de defunciones de mujeres en estado de embarazo o dentro de los 42 días siguientes a su terminación debido a cualquier causa relacionada con, o agravada por, el embarazo mismo o su atención (con exclusión de las muertes accidentales o incidentales) en un determinado año y por cada 100,000 nacidos vivos. Estos datos permiten conocer cuáles son las entidades que enfrentan de mejor manera esta problemática.

En la Numeralia 2014 se incluyen dos estimaciones de la RMM: la del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) y la que hace el Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en las proyecciones de la población de México 2010-2050. Para la generación de sus estadísticas, el SINAC utiliza como denominador los certificados de nacimientos con corrección del subregistro por la DGIS en nueve entidades federativas: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Por su parte, el CONAPO utiliza las estimaciones de las variables demográficas publicadas en el 2012 y obtenidas a partir de la conciliación demográfica 1990-2010 y de las proyecciones nacionales y por entidad 2010-2050, Versión Censo 2010, realizadas con los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010.

La inclusión de estas dos estimaciones de la RMM permitirá que las y los lectores comparen estos datos con las Numeralias de 2009 a 2013, según sea el caso, e identifiquen los cambios en esta razón a partir de la modificación del denominador. De esta manera, si se estima la RMM nacional a partir del número de nacidos vivos de las proyecciones del CONAPO, que se han utilizado para dar seguimiento a la MM desde el periodo 1990-2010, y a partir del número de certificados de nacimientos del SINAC, podemos reconocer que es la misma e igual a 38.9 defunciones maternas por cada 100,000 nacidos vivos. Sin embargo, en cada entidad federativa las diferencias entre estas dos mediciones ascienden máximo a 3.6 defunciones. Incluir las estimaciones de la RMM a partir de las proyecciones posibilita la comparación entre las Numeralias.

En la Numeralia 2014, al igual que en la del 2013, se incluyeron los porcentajes de fallecimientos de las menores de 19 años, aunque no sea el porcentaje más relevante en la distribución. En aquellas entidades donde no ocurrieron casos de MM en este grupo de edad, se registró el porcentaje de la categoría 19-24 años. Para quienes deseen hacer un comparativo entre las Numeralias, cabe precisar que en las versiones anteriores a la categoría de “no trabaja o inactiva”, que el INEGI incluye como característica de la condición laboral de la mujer fallecida, se le describía como “se dedica al hogar”; sin embargo, el INEGI modificó las categorías de esta variable en el 2014, desglosando “no trabaja o inactiva” en las opciones de “no ocupada”, “ama de casa”, “estudiante”, “jubilada” o “pensionada”. En la Numeralia 2014 se incluyeron sólo a aquellas que se dedican al hogar; es decir, las consideras como “amas de casa”.

En la Numeralia 2014 se sigue incluyendo la adscripción étnica de las fallecidas a través del identificador “hablante de lengua indígena”, así como información relacionada con los antecedentes de atención materna de las fallecidas; datos que no se encuentran disponibles en la base de mortalidad publicada por el INEGI, sólo en la base que elabora la DGIS. Se conservan también otras variables de interés como: el lugar de ocurrencia de la muerte, la condición de aseguramiento de la fallecida y la causa de muerte relacionada con el aborto, aun cuando ésta no es parte de las principales causas de MM en los estados. Estos datos permitirán al Observatorio dar seguimiento al número de muertes por institución, entre otras características.

El total de muertes maternas ocurridas en el país en el 2014 fue de 1,012, incluyendo las tardías, lo que representa una menos que en el 2013 (1,013 MM). No obstante, el número de muertes maternas incluido en las distribuciones por entidad federativa en esta Numeralia es el que se considera oficialmente para estimar la RMM (872), lo que significa 11 muertes más que en el 2013 (861). Sólo las muertes tardías, resultado del coriocarcinoma, y las que ocurrieron después de los 42 días del parto, no están contabilizadas dentro de la RMM. En la Numeralia 2014, al igual que en las del 2012 y 2013, se incluyen los

datos más relevantes de las 140 muertes tardías (29 más que en el 2012 y 10 menos que en el 2013) con la finalidad de hacerlas visibles como parte del problema de la MM en México.

Se vuelve a incluir también en esta Numeralia un documento metodológico con la descripción de la construcción de las variables, así como la manera en que se definió operativamente cada variable de la MM del país. Asimismo, el lector o la lectora podrán consultar un archivo con las instrucciones y los comandos mediante los que se obtuvieron los resultados con el paquete estadístico STATA versión 12.1. Adicionalmente, se colgarán en la web los mismos resultados en Excel con el fin de que los usuarios del OMM puedan consultarlos de manera más amigable.

**Graciela Freyermuth y Marisol Luna,
febrero 2015**

NOTAS TÉCNICAS

- La categoría “Servicios federales o estatales de salud” incluye: Secretaría de Salud, IMSS-Oportunidades y Otra unidad pública.
- La categoría “Servicios de salud de instituciones de seguridad social” incluye: IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SECMAR.
- Para el año 2014, el INEGI define la categoría “no trabaja o inactiva” como “no ocupada”, “ama de casa”, “estudiante”, “jubilada o pensionada”. De manera, que la categoría “Se dedica al hogar” corresponde al código etiquetado como “Ama de casa”. En términos de comparabilidad en las versiones anteriores de la Numeralia la categoría de “no trabaja o inactiva” se describía como “se dedica al hogar”.
- La categoría “Aborto” incluye los códigos de clasificación CIE-10: O00-O06.
- La categoría “Por causas obstétricas indirectas” incluye los códigos de clasificación CIE-10: B20- B24 más embarazo, F53, M830 y O98-O99.
- La categoría “Enfermedades hipertensivas del embarazo” incluye los códigos de clasificación CIE-10: O10-O16.
- La categoría “Otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto” incluye los códigos de clasificación CIE-10: O21, O23-O43, O47-O66, O68-O71 y O73-O84.
- Para simplificar el análisis, las características analizadas en los casos en los cuales se encontró un espacio en blanco, se ignoraba o no se especificó dicha característica, se utilizó la categoría etiquetada como “No se especifica” o “se ignora”.

POR RESIDENCIA HABITUAL DE LA MUJER


NACIONAL TARDÍAS

MUERTES MATERNAS TARDÍAS Y
POR CORIOCARCINOMA*

140 MUERTES EN 2014

<p>5.7% era menor de 19 años</p>	<p>ESCOLARIDAD</p>	
<p>6.4% era hablante de lengua indígena</p>	<p>2.9% no tenía escolaridad</p>	<p>40.7% contaba con secundaria incompleta o completa</p>
<p>80.0% vivía en unión libre o era casada</p>	<p>AFILIACIÓN</p>	
<p>61.4% se dedicaba al hogar</p>	<p>10.7% no contaba con seguridad social ni protección a la salud</p>	<p>57.9% contaba con Seguro Popular</p>
<p>ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO</p>		
<p>94.3% contó con asistencia médica</p>		
<p>95.7% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>		
<p>CONTROL PRENATAL</p>		<p>ATENCIÓN MÉDICA</p>
<p>69.3% se ignora si tuvo control prenatal durante el embarazo</p>	<p>21.4% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p>	<p>13.6% tuvo más de cinco consultas prenatales</p>
<p>CAUSAS</p>		<p>58.6% recibió atención de un médico durante el parto</p>
<p>67.9% por causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto</p>	<p>17.9% por secuelas de causas obstétricas directas</p>	<p>38.6% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</p>
<p>LUGAR DE OCURRENCIA</p>		<p>0.7% en el hogar</p>
<p>55.0% murió en una institución de servicios federales o estatales de salud</p>	<p>18.6% en el hogar</p>	

* Causas de muerte O96X, O97X y C58X.

	ESCOLARIDAD		AFILIACIÓN	
	4.8% no tenía escolaridad	32.0% contaba con secundaria incompleta o completa	12.7% no tenía seguridad social ni protección a la salud	56.8% contaba con Seguro Popular
10.4% era menor de 19 años	LUGAR DE OCURRENCIA		ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO	
81.3% vivía en unión libre o era casada	56.0% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	85.9% contó con asistencia médica		
9.9% era hablante de lengua indígena	20.4% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social	96.6% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico		
60.9% se dedicaba al hogar	9.2% en su casa	CONTROL PRENATAL		
CAUSAS		8.5% en una unidad médica privada	15.4% no tuvo control prenatal durante el embarazo	
32.1% murió por causas obstétricas indirectas	20.5% por enfermedades hipertensivas del embarazo	14.3% por hemorragia del embarazo, parto y puerperio	46.3% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo	
ATENCIÓN MÉDICA		9.2% por aborto	22.6% tuvo entre tres y cinco consultas prenatales	
72.1% recibió atención de un médico durante el parto	45.0% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	5.2% en el hogar	30.0% tuvo más de cinco consultas prenatales	

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 38.9.



16.7%
era menor de 19 años

83.3%
vivía en unión libre
o era casada

50.0%
se dedicaba al hogar

ESCOLARIDAD

0% tenía primaria incompleta o completa
50.0% tenía secundaria incompleta o completa

AFILIACIÓN

66.7% contaba con Seguro Popular

LUGAR DE OCURRENCIA

66.7% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
33.3% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

83.3% contó con asistencia médica
100.0% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

33.3%
inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

0%
tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

ATENCIÓN MÉDICA

100.0%
recibió atención de un médico durante el parto

50.0%
atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

CAUSAS

50.0%
murió por otras causas obstétricas indirectas

16.7%
Otras complicaciones principalmente del embarazo y parto

*Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 22.7.



ESCOLARIDAD

23.5%

contaba con primaria incompleta o completa

29.4%

contaba con secundaria incompleta o completa

AFILIACIÓN

5.9%

era menor de 19 años

11.8 % no tenía seguridad social ni protección a la salud

41.2% contaba con Seguro Popular

LUGAR DE OCURRENCIA

52.9%

vivía en unión libre o era casada

47.1% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

17.6% en el hogar

17.6% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

82.4%

contó con asistencia médica

88.2%

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

35.3%

no tuvo control prenatal durante el embarazo

35.3%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

5.9%

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

29.4%

tuvo más de cinco consultas prenatales

CAUSAS

58.8%

murió por causas obstétricas indirectas

17.6%

por enfermedades hipertensivas del embarazo

ATENCIÓN MÉDICA

70.6%

recibió atención de un médico durante el parto

41.2%

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050. Versión Censo 2010 es de 28.9.



50.0%

tenía entre 19 y 24 años

100.0%

vivía en unión libre o era casada

50.0%

se dedicaba al hogar

ESCOLARIDAD

50.0% contaba con secundaria incompleta o completa

50.0% contaba con estudios profesionales

AFILIACIÓN

100.0% contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

LUGAR DE OCURRENCIA

100.0% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

100.0% contó con asistencia médica

100.0% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

50.0%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

50.0%

tuvo más de cinco consultas prenatales

CAUSAS

50.0%

por enfermedades hipertensivas del embarazo

ATENCIÓN MÉDICA

50.0%

recibió atención de un médico durante el parto

50.0%

atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

50.0%

por aborto

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 16.1.



66.7%

era menor de 19 años

66.7%

vivía en unión libre o era casada

100.0%

se dedicaba al hogar

ESCOLARIDAD

33.3% contaba con primaria incompleta o completa

66.7% contaba con secundaria incompleta o completa

AFILIACIÓN

100% contaba con Seguro Popular

LUGAR DE OCURRENCIA

33.3% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

33.3% en vía pública

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

100.0% contó con asistencia médica

100.0% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

66.7%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

66.7%

tuvo más de cinco consultas prenatales

ATENCIÓN MÉDICA

66.7%

recibió atención de un médico durante el parto

33.3%

recibió atención de una partera

66.7%

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

CAUSAS

33.3%

por enfermedades hipertensivas del embarazo

33.3%

por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

33.3%

por aborto

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 18.1.



ESCOLARIDAD

31.8%

contaba con primaria incompleta o completa

22.7%

contaba con secundaria incompleta o completa

ASISTENCIA MÉDICA

86.4%

contó con asistencia médica

95.5%

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

4.5%

era menor de 19 años

86.4%

vivía en unión libre o era casada

55.5%

se dedicaba al hogar

CONTROL PRENATAL

4.5%

no tuvo control prenatal durante el embarazo

59.1%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

9.1%

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

45.5%

tuvo más de cinco consultas prenatales

CAUSAS

18.2%

por enfermedades hipertensivas del embarazo

4.5%

por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

27.3%

murió por causas obstétricas indirectas

18.2%

por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

AFILIACIÓN

9.1%

no tenía seguridad social ni protección a la salud

50.0%

contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

36.4%

contaba con Seguro Popular

LUGAR DE OCURRENCIA

40.9%

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

40.9%

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

9.1%

en el hogar

4.5%

en vía pública

ATENCIÓN MÉDICA

90.9%

recibió atención de un médico durante el parto

31.8%

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 40.6.



25.0%

tenía entre 19 y 24 años

100.0%

vivía en unión libre o era casada

75.0%

se dedicaba al hogar

ESCOLARIDAD

25.0%

contaba con primaria incompleta o completa

50.0%

contaba con secundaria incompleta o completa

25.0%

contaba con estudios profesionales

AFILIACIÓN

50.0%

contaba con Seguro Popular

50.0%

contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

LUGAR DE OCURRENCIA

50.0%

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

50.0%

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

100.0%

contó con asistencia médica

100.0%

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

50.0%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

25.0%

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

25.0%

tuvo más de cinco consultas prenatales

CAUSAS

50.0%

murió por causas obstétricas indirectas

50.0%

por enfermedades hipertensivas del embarazo

ATENCIÓN MÉDICA

75.0%

recibió atención de un médico durante el parto

25.0%

recibió atención de un auxiliar de salud

100.0%

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 29.6.



ESCOLARIDAD

14.3%
no tenía
escolaridad

39.0%
contaba con primaria
incompleta o completa

24.7%
contaba con secundaria
incompleta o completa

AFILIACIÓN

7.8%
era menor de 19 años

16.9%
no tenía seguridad social ni
protección a la salud

62.3%
contaba con Seguro
Popular

5.2%
contaba con
IMSS-Oportunidades

87.0%
vivía en unión libre
o era casada

LUGAR DE OCURRENCIA

ASISTENCIA Y
CERTIFICADO MÉDICO

26.0%
era hablante de
lengua indígena

55.8%
murió en una clínica u hospital
del servicio federal o estatal de
salud

80.5%
contó con asistencia médica

14.3%
en el hogar

16.9%
en una clínica u hospital de los
servicios de salud de las institu-
ciones de seguridad social

94.8%
de los casos tuvo certificado
otorgado por un médico

79.2%
se dedicaba al hogar

7.8%
en la vía pública

CONTROL PRENATAL

CAUSAS

24.7%
murió por cau-
sas obstétricas
indirectas

26.0%
por hemorragia
del embarazo,
parto y puerperio

22.1%
por enfermeda-
des hipertensivas
del embarazo

11.7%
por aborto

22.1%
no tuvo control prenatal
durante el embarazo

32.5%
inició el cuidado prenatal
entre el primer y tercer
meses del embarazo

ATENCIÓN MÉDICA

51.9%
recibió aten-
ción de un mé-
dico durante el
parto

19.5%
recibió atención
de una partera

40.3%
atendió el parto
en una clínica u
hospital del servicio
federal o estatal de
salud

20.8%
atendió el
parto en el
hogar

18.2%
tuvo entre tres y cinco
consultas prenatales

19.5%
tuvo más de cinco consultas
prenatales

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 68.1.



ESCOLARIDAD

17.9%
no tenía
escolaridad

20.5%
contaba con pri-
maria incomple-
ta o completa

17.9%
contaba con se-
cundaria incom-
pleta o completa

20.5%
contaba con bachille-
rato o preparatoria in-
completa o completa

AFILIACIÓN

20.5%
era menor de 19 años

51.3% contaba con
Seguro Popular

12.8% no tenía seguridad social ni
protección a la salud

CAUSAS

76.9%
vivía en unión libre
o era casada

20.5% murió por causas obstétricas
indirectas

10.3% por aborto

23.1% por enfermedades hipertensivas
del embarazo

20.5% por hemorragia del embarazo,
parto y puerperio

20.5% por otras complicaciones,
principalmente del embarazo y
parto

ASISTENCIA Y
CERTIFICADO MÉDICO

76.9%
contó con asistencia médica

100.0%
de los casos tuvo certificado
otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

20.5%
no tuvo control prenatal
durante el embarazo

56.4%
inició el cuidado prenatal
entre el primer y tercer
meses del embarazo

28.2%
tuvo entre tres y cinco
consultas prenatales

33.3%
tuvo más de cinco consultas
prenatales

LUGAR DE OCURRENCIA

41.0%
murió en una clí-
nica u hospital del
servicio federal o
estatal de salud

25.6%
en una uni-
dad médica
privada

17.9%
en una clínica u hospital
de los servicios de salud
de las instituciones de
seguridad social

5.1%
en el hogar

ATENCIÓN MÉDICA

71.8%
recibió atención
de un médico
durante el parto

5.1%
recibió atención
de un pariente o
familiar

41.0%
atendió el parto en
una clínica u hospital
del servicio federal o
estatal de salud

7.7%
atendió el
parto en el
hogar

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 56.5.



7.1%
era menor de 19 años

73.2%
vivía en unión libre o era casada

5.4%
era hablante de lengua indígena

51.8%
se dedicaba al hogar

ESCOLARIDAD

35.7%
contaba con secundaria incompleta o completa

25.0%
contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

23.2%
contaba con estudios profesionales

AFILIACIÓN

39.3% no tenía seguridad social ni protección a la salud

30.4% contaba con Seguro Popular

LUGAR DE OCURRENCIA

55.4% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

10.7% en una unidad médica privada

21.4% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

7.1% en el hogar

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

94.6%
contó con asistencia médica

100.0%
de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

8.9%
no tuvo control prenatal durante el embarazo

50.0%
inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

17.9%
tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

32.1%
tuvo más de cinco consultas prenatales

CAUSAS

21.4%
murió por causas obstétricas indirectas

16.1%
por enfermedades hipertensivas del embarazo

10.7%
por aborto

14.3%
por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

ATENCIÓN MÉDICA

76.8%
recibió atención de un médico durante el parto

1.8%
recibió atención de un pariente o familiar

44.6%
atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 43.2.



12.0%
era menor de 19 años

88.0%
vivía en unión libre o era casada

80.0%
se dedicaba al hogar

ESCOLARIDAD

32.0% contaba con primaria incompleta o completa

40.0% contaba con secundaria incompleta o completa

ASISTENCIA MÉDICA

80.0% contó con asistencia médica

96.0% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

8.0% no tuvo control prenatal durante el embarazo

48.0% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

20.0% tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

24.0% tuvo más de cinco consultas prenatales

CAUSAS

28.0% murió por causas obstétricas indirectas

12.0% por enfermedades hipertensivas del embarazo

16.0% por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

4.0% por aborto

AFILIACIÓN

4.0% no tenía seguridad social ni protección a la salud

28.0% contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

LUGAR DE OCURRENCIA

52.0% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

24.0% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

4.0% en el hogar

8.0% en vía pública

60.0% contaba con Seguro Popular

ATENCIÓN MÉDICA

76.0% recibió atención de un médico durante el parto

44.0% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

4.0% recibió atención de un pariente o familiar

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 74.6.



ESCOLARIDAD

34.4%	50.0%	6.3%
contaba con primaria incompleta o completa	contaba con secundaria incompleta o completa	contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

AFILIACIÓN

65.6%	contaba con Seguro Popular
31.3%	contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

LUGAR DE OCURRENCIA

75.0%	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
18.8%	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
6.3%	en el hogar

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

93.8%	contó con asistencia médica
100.0%	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

18.8%	no tuvo control prenatal durante el embarazo
31.3%	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
31.3%	tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
18.8%	tuvo más de cinco consultas prenatales

CAUSAS

43.8%	9.4%	18.8%	6.3%
murió por causas obstétricas indirectas	por enfermedades hipertensivas del embarazo	por hemorragia del embarazo, parto y puerperio	por aborto

LUGAR DE OCURRENCIA

87.5%	recibió atención de un médico durante el parto
3.1%	recibió atención de una partera
65.6%	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 28.0.



11.6%
era menor de 19 años

90.7%
vivía en unión libre o era casada

27.9%
era hablante de lengua indígena

65.1%
se dedicaba al hogar

ESCOLARIDAD

11.6%
no tenía escolaridad

18.6%
contaba con secundaria incompleta o completa

51.2%
contaba con primaria incompleta o completa

AFILIACIÓN

14.0% no tenía seguridad social ni protección a la salud

74.4% contaba con Seguro Popular

ATENCIÓN MÉDICA

48.8% recibió atención de un médico durante el parto

20.9% recibió atención de una partera
7.0% recibió atención de un pariente o familiar

41.9% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

2.3% atendió el parto en el hogar

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

51.2%
contó con asistencia médica

90.7%
de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

9.3%
no tuvo control prenatal durante el embarazo

51.2%
inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

23.3%
tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

27.9%
tuvo más de cinco consultas prenatales

CAUSAS

34.9%
murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

18.6%
por enfermedades hipertensivas del embarazo

25.6%
por causas obstétricas indirectas

4.7%
por aborto

LUGAR DE OCURRENCIA

51.2%
murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud


25.6%
en el hogar

2.3%
en una unidad médica privada

9.3%
en vía pública

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 58.4.



ESCOLARIDAD

33.3% contaba con primaria incompleta o completa	30.6% contaba con secundaria incompleta o completa	27.8% contaba con bachillerato o prepa- ratoria incompleta o completa
---	---	--

AFILIACIÓN

55.6% contaba con Seguro Popular
11.1% no tenía seguridad social ni protección a la salud

CAUSAS

36.1% murió por causas obstétricas indirectas
30.6% por enfermedades hipertensivas del embarazo
5.6% por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
11.1% por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
5.6% por aborto

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

91.7% contó con asistencia médica
100.0% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

2.8% no tuvo control prenatal durante el embarazo
61.1% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

8.3%
era menor de 19 años

80.6%
vivía en unión libre o era casada

8.3%
era hablante de lengua indígena

27.8%
se dedicaba al hogar

LUGAR DE OCURRENCIA

61.1% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	25.0% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social	5.6% en una unidad médica privada	5.6% en el hogar
---	--	---	----------------------------

ATENCIÓN MÉDICA

75.0% recibió atención de un médico durante el parto	44.4% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	5.6% atendió el parto en una unidad médica privada
--	--	--

22.2% tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
19.4% tuvo más de cinco consultas prenatales

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 64.8.



ESCOLARIDAD

30.8%	30.8%	17.3%
contaba con primaria incompleta o completa	contaba con secundaria incompleta o completa	contaba con estudios profesionales

AFILIACIÓN

11.5%	46.2%	26.9%
no tenía seguridad social ni protección a la salud	contaba con Seguro Popular	contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

ATENCIÓN MÉDICA

75.0%	recibió atención de un médico durante el parto
1.9%	recibió atención de un pariente o familiar
40.4%	atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
15.4%	atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

88.5%	contó con asistencia médica
100.0%	de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

9.6%	no tuvo control prenatal durante el embarazo
67.3%	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

21.2%

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

44.2%

tuvo más de cinco consultas prenatales

15.4%
era menor de 19 años

86.5%
vivía en unión libre o era casada

1.9%
era hablante de lengua indígena

67.3%
se dedicaba al hogar

CAUSAS

46.2%	17.3%	5.8%	5.8%
murió por causas obstétricas indirectas	por enfermedades hipertensivas del embarazo	por hemorragia del embarazo, parto y puerperio	por aborto

LUGAR DE OCURRENCIA

50.0%	21.2%	11.5%
murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social	en el hogar

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 34.9.



11.1%

era menor de 19 años

79.8%

vivía en unión libre o era casada

4.0%

era hablante de lengua indígena

61.6%

se dedicaba al hogar

ESCOLARIDAD

18.2%

contaba con primaria incompleta o completa

40.4%

contaba con secundaria incompleta o completa

30.3%

contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

AFILIACIÓN

15.2% no tenía seguridad social ni protección a la salud

56.6% contaba con Seguro Popular

LUGAR DE OCURRENCIA

53.5% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

9.1% en el hogar

10.1% en una unidad médica privada

22.2% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

92.9%

contó con asistencia médica

99.0%

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

13.1%

no tuvo control prenatal durante el embarazo

50.5%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

21.2%

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

37.4%

tuvo más de cinco consultas prenatales

CAUSAS

23.2%

murió por causas obstétricas indirectas

29.3%

por enfermedades hipertensivas del embarazo

15.2%

por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

10.1%

por aborto

ATENCIÓN MÉDICA

79.8%

recibió atención de un médico durante el parto

48.5%

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es 32.2.



11.4%
era menor de
19 años

81.8%
vivía en unión libre
o era casada

4.5%
era hablante de
lengua indígena

50.0%
se dedicaba al hogar

ESCOLARIDAD

38.6% contaba con primaria
incompleta o completa

29.5% contaba con secundaria
incompleta o completa

AFILIACIÓN

15.9%
no tenía seguridad social ni
protección a la salud

61.4%
contaba con Seguro Popular

LUGAR DE OCURRENCIA

68.2% murió en una clínica u hospital
del servicio federal o estatal de
salud

9.1% en una clínica u hospital de los
servicios de salud de las institu-
ciones de seguridad social

9.1% en una unidad médica privada

9.1% en el hogar

4.5% en vía pública

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

90.9%
contó con asistencia médica

95.5%
de los casos tuvo certificado
otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

11.4%
no tuvo control prenatal
durante el embarazo

54.5%
inició el cuidado prenatal
entre el primer y tercer
meses del embarazo

20.5%
tuvo entre tres y cinco
consultas prenatales

31.8%
tuvo más de cinco
consultas prenatales

CAUSAS

15.9%
por enfermedades
hipertensivas del
embarazo

38.6%
por causas
obstétricas
indirectas

13.6%
por hemorragia
del embarazo,
parto y puerperio

11.4%
por aborto

ATENCIÓN MÉDICA

72.7% recibió atención de un médico durante el parto

2.3% recibió atención de una partera

43.2% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio fede-
ral o estatal de salud

11.4% atendió el parto en una unidad médica privada

18.2% atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios
de salud de las instituciones de seguridad social

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050. Versión Censo 2010 es 48.7.



ESCOLARIDAD

33.3%
sin escolaridad

33.3%
contaba con primaria
incompleta o completa

33.3%
contaba con bachillerato o prepa-
ratoria incompleta o completa

AFILIACIÓN

33.3%
era menor de 19 años

66.7% contaba con
Seguro Popular

33.3% contaba con seguro en salud del IMSS,
ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

LUGAR DE OCURRENCIA

66.7%
vivía en unión libre
o era casada

33.3% murió en una clínica u hospital
del servicio federal o estatal de salud

33.3% en una clínica u hospital de los
servicios de salud de las institu-
ciones de seguridad social

33.3% en el hogar

0% en una unidad médica privada

ASISTENCIA Y
CERTIFICADO MÉDICO

66.7%
contó con asistencia médica

100.0%
de los casos tuvo certificado
otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

33.3%
inició el cuidado prenatal
entre el primer y tercer
meses del embarazo

33.3%
tuvo entre tres y cinco
consultas prenatales

33.3%
tuvo más de cinco
consultas prenatales

CAUSAS

33.3% por causas obstétricas indirectas

33.3% por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

ATENCIÓN MÉDICA

66.7%
recibió atención
de un médico
durante el parto

33.3%
recibió atención
de una partera

33.3%
atendió el parto en una
clínica u hospital del servicio
federal o estatal de salud

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 8.6.



ESCOLARIDAD

66.7%

contaba con secundaria incompleta o completa

16.7%

contaba con estudios profesionales

16.7%

contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

AFILIACIÓN

33.3%

tenía entre 19 y 24 años

50.0%

contaba con Seguro Popular

16.7%

contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

ATENCIÓN MÉDICA

66.7%

recibió atención de un médico durante el parto

16.7%

recibió atención de un pariente o familiar

50.0%

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

16.7%

atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

66.7%

contó con asistencia médica

100.0%

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

33.3%

no tuvo control prenatal durante el embarazo

33.3%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

16.7%

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

33.3%

tuvo más de cinco consultas prenatales

CAUSAS

50.0%

por enfermedades hipertensivas del embarazo

33.3%

por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

16.7%

por otras complicaciones, principalmente puerperales

LUGAR DE OCURRENCIA

33.3%

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

33.3%

en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

16.7%

murió en el hogar

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050. Versión Censo 2010 es de 27.1.



ESCOLARIDAD

37.5% contaba con primaria incompleta o completa	37.5% contaba con secundaria incompleta o completa	12.5% contaba con estudios profesionales
---	---	---

AFILIACIÓN

43.8% contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR	31.3% contaba con Seguro Popular	6.3% no tenía seguridad social ni protección a la salud
--	---	--

LUGAR DE OCURRENCIA

62.5% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	25.0% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las institu- ciones de seguridad social	6.3% en una unidad médica privada	6.3% en el hogar
---	--	---	----------------------------

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

81.3% contó con asistencia médica
93.8% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

31.3% no tuvo control prenatal durante el embarazo
31.3% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
18.8% tuvo entre tres y cinco consultas prenatales
31.3% tuvo más de cinco consultas prenatales

12.5%
era menor de 19 años

75.0%
vivía en unión libre
o era casada

6.3%
era hablante de
lengua indígena

56.3%
se dedicaba al hogar

CAUSAS

43.8% murió por causas obstétricas indirectas	25.0% por enfermedades hiperten- sivas del embarazo	25.0% por aborto
--	--	----------------------------

ATENCIÓN MÉDICA

68.8% recibió atención de un médico durante el parto	43.8% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	25.0% atendió el parto en una clínica u hospital de los ser- vicios de salud de las institu- ciones de seguridad social
--	---	--

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 18.7.



10.5%

era menor de 19 años

71.1%

vivía en unión libre o era casada

36.8%

era hablante de lengua indígena

60.5%

se dedicaba al hogar

ESCOLARIDAD

28.9%

contaba con primaria incompleta o completa

34.2%

contaba con secundaria incompleta o completa

7.9%

contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

AFILIACIÓN

2.6%

no tenía seguridad social ni protección a la salud

73.7%

contaba con Seguro Popular

15.8 %

contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

LUGAR DE OCURRENCIA

60.5%

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

13.2%

en el hogar

10.5%

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

5.3%

en la vía pública

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

71.1%

contó con asistencia médica

89.5%

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

21.1%

no tuvo control prenatal durante el embarazo

26.3%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

15.8%

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

21.1%

tuvo más de cinco consultas prenatales

CAUSAS

39.5%

murió por causas obstétricas indirectas

7.9%

por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

13.2%

por enfermedades hipertensivas del embarazo

13.2%

por aborto

ATENCIÓN MÉDICA

57.9%

recibió atención de un médico durante el parto

5.3%

recibió atención de una partera

47.4%

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

18.4%

atendió el parto en el hogar

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 46.7.



13.0%
era menor de
19 años

82.6%
vivía en unión libre
o era casada

10.9%
era hablante de
lengua indígena

60.9%
se dedicaba al hogar

ESCOLARIDAD

47.8% contaba con primaria
incompleta o completa

28.3% contaba con secundaria
incompleta o completa

AFILIACIÓN

15.2%
no tenía seguridad social
ni protección a la salud

2.2%
contaba con IMSS-Oportunidades

67.4%
contaba con
Seguro Popular

LUGAR DE OCURRENCIA

65.2%
murió en una clínica u hospital
del servicio federal o estatal de
salud

8.7%
en una clínica u hospital de los
servicios de salud de las institu-
ciones de seguridad social

8.7%
en una unidad médica privada

13.0%
en el hogar

2.2%
en vía pública

ASISTENCIA Y
CERTIFICADO MÉDICO

87.0%
contó con asistencia médica

95.7%
de los casos tuvo certificado
otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

21.7%
no tuvo control prenatal
durante el embarazo

39.1%
inició el cuidado prenatal
entre el primer y tercer
meses del embarazo

34.8%
tuvo entre tres y cinco
consultas prenatales

15.2%
tuvo más de cinco
consultas prenatales

CAUSAS

13.0%
murió por hemorra-
gia del embarazo,
parto y puerperio

28.3%
por causas
obstétricas
indirectas

17.4%
por enfermeda-
des hipertensivas
del embarazo

10.9%
por aborto

ATENCIÓN MÉDICA

63.0%
recibió atención de un médico durante el parto

15.2%
recibió atención de una partera

39.1%
atendió el parto en una clínica u hospital del servicio fede-
ral o estatal de salud

19.6%
atendió el parto en una unidad médica privada

4.3%
atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios
de salud de las instituciones de seguridad social

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 36.0.



ESCOLARIDAD

42.9%

contaba con secundaria incompleta o completa

35.7%

contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

ATENCIÓN MÉDICA

7.1%

era menor de 19 años

71.4%

recibió atención de un médico durante el parto

50.0%

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

85.7%

vivía en unión libre o era casada

LUGAR DE OCURRENCIA

57.1%

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

21.4%

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

7.1%

en vía pública

7.1%

en el hogar

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

100.0%

contó con asistencia médica

100.0%

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

71.4%

se dedicaba al hogar

CONTROL PRENATAL

CAUSAS

21.4%

murió por enfermedades hipertensivas del embarazo

42.9%

por causas obstétricas indirectas

7.1%

por aborto

21.4%

no tuvo control prenatal durante el embarazo

28.6%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

28.6%

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

21.4%

tuvo más de cinco consultas prenatales

AFILIACIÓN

50.0%

contaba con Seguro Popular

28.6%

contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

14.3%

no tenía seguridad social ni protección a la salud

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 37.0.



LUGAR DE OCURRENCIA

50.0%

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

37.5%

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

12.5%

en una unidad médica privada

12.5%

era menor de 19 años

75.0%

vivía en unión libre o era casada

12.5%

era hablante de lengua indígena

50.0%

se dedicaba al hogar

AFILIACIÓN

37.5% contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

50.0% contaba con Seguro Popular

ESCOLARIDAD

12.5% contaba con primaria incompleta o completa

37.5% contaba con secundaria incompleta o completa

12.5% contaba con preparatoria o bachillerato incompleto o completo

37.5% contaba con estudios profesionales

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

87.5%

contó con asistencia médica

100.0%

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

ATENCIÓN MÉDICA

100.0%

recibió atención de un médico durante el parto

50.0%

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

CAUSAS

25.0%

murió por enfermedades hipertensivas del embarazo

37.5%

por causas obstétricas indirectas

25.0%

murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

CONTROL PRENATAL

12.5%

no tuvo control prenatal durante el embarazo

37.5%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

25.0%

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

12.5%

tuvo más de cinco consultas prenatales

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 27.8.



ESCOLARIDAD

15.4% contaba con primaria incompleta o completa	30.8% contaba con secundaria incompleta o completa	46.2% contaba con bachillerato o prepa- ratoria incompleta o completa
---	---	--

AFILIACIÓN

84.6% contaba con Seguro Popular

LUGAR DE OCURRENCIA

61.5%	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
7.7%	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las institu- ciones de seguridad social
7.7%	en una unidad médica privada
15.4%	en el hogar

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

92.3%
contó con asistencia médica

100.0%
de los casos tuvo certificado
otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

7.7%
no tuvo control prenatal
durante el embarazo

46.2%
inició el cuidado prenatal
entre el primer y tercer
meses del embarazo

23.1%
tuvo entre tres y cinco
consultas prenatales

46.2%
tuvo más de cinco consultas
prenatales

CAUSAS

30.8% murió por causas obstétricas indirectas	30.8% por enfermedades hipertensivas del embarazo	15.4% murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio
--	---	--

ATENCIÓN MÉDICA

69.2% recibió atención de un médico durante el parto

53.8% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio
federal o estatal de salud

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 24.3.



ESCOLARIDAD

41.2% contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

23.5% contaba con estudios profesionales

AFILIACIÓN

5.9%
era menor de 19 años

23.5%
no tenía seguridad social ni protección a la salud

41.2%
contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

35.3%
contaba con Seguro Popular

88.2%
vivía en unión libre o era casada

CAUSAS

17.6% murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

5.9% por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto

23.5% por enfermedades hipertensivas del embarazo

35.3% por causas obstétricas indirectas

5.9% por aborto

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

100.0%
contó con asistencia médica

94.1%
de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

5.9%
era hablante de lengua indígena

64.7%
se dedicaba al hogar

CONTROL PRENATAL

5.9%
no tuvo control prenatal durante el embarazo

47.1%
inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

35.3%
tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

23.5%
tuvo más de cinco consultas prenatales

LUGAR DE OCURRENCIA

47.1%
murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

41.2%
en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

11.8%
en una unidad médica privada

ATENCIÓN MÉDICA

88.2%
recibió atención de un médico durante el parto

41.2%
atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 31.3.



ESCOLARIDAD

27.8%

contaba con secundaria incompleta o completa

33.3%

contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

22.2%

contaba con estudios profesionales

ATENCIÓN MÉDICA

5.6%

era menor de 19 años

77.8%

recibió atención de un médico durante el parto

27.8%

atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

72.7%

vivía en unión libre o era casada

LUGAR DE OCURRENCIA

38.9%

murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

44.4%

en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

11.1%

en una unidad médica privada

5.6%

en el hogar

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

100.0%

contó con asistencia médica

100.0%

de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

55.6%

se dedicaba al hogar

CAUSAS

5.6%

murió por enfermedades hipertensivas del embarazo

50.0%

por causas obstétricas indirectas

11.1%

murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

11.1%

por aborto

CONTROL PRENATAL

22.2%

no tuvo control prenatal durante el embarazo

38.9%

inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

AFILIACIÓN

5.6%

no tenía seguridad social ni protección a la salud

50.0%

contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR

33.3%

contaba con Seguro Popular

11.1%

tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

27.8%

tuvo más de cinco consultas prenatales

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 34.0.



ESCOLARIDAD

20.0%
contaba con primaria
incompleta o completa

45.0%
contaba con secundaria
incompleta o completa

10.0%
no tenía escolaridad

AFILIACIÓN

10.0%
era menor de 19 años

5.0% no tenía seguridad social
ni protección a la salud

65.0% contaba con Seguro Popular

CAUSAS

75.0%
vivía en unión libre
o era casada

35.0% murió por causas obstétri-
cas indirectas

30.0% por enfermedades hiper-
tensivas del embarazo

10.0% por aborto

5.0% por hemorragia del emba-
razo, parto y puerperio

5.0%
era hablante de
lengua indígena

45.0%
se dedicaba al hogar

ASISTENCIA Y
CERTIFICADO MÉDICO

90.0%
contó con asistencia médica

100.0%
de los casos tuvo certificado
otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

20.0%
no tuvo control prenatal
durante el embarazo

40.0%
inició el cuidado prenatal entre
el primer y tercer meses del
embarazo

45.0%
tuvo entre tres y cinco
consultas prenatales

35.0%
tuvo más de cinco consultas
prenatales

LUGAR DE OCURRENCIA

75.0% murió en una clínica u hospital del servicio federal
o estatal de salud

25.0% en una clínica u hospital de los servicios de salud
de las instituciones de seguridad social

ATENCIÓN MÉDICA

80.0% recibió atención de un médico durante el parto

60.0% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio
federal o estatal de salud

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 43.3.



ESCOLARIDAD

29.4% contaba con primaria incompleta o completa

58.8% contaba con secundaria incompleta o completa

AFILIACIÓN

5.9%
era menor de 19 años

5.9% no tenía seguridad social
ni protección a la salud

82.4% contaba con Seguro Popular

LUGAR DE OCURRENCIA

94.1%
vivía en unión libre
o era casada

64.7% murió en una clínica u hospital
del servicio federal o estatal de
salud

17.6% en una clínica u hospital de los
servicios de salud de las institu-
ciones de seguridad social

11.8% en una unidad médica privada

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

94.1%
contó con asistencia médica

88.2%
de los casos tuvo certificado
otorgado por un médico

CAUSAS

64.7%
murió por causas obstétricas
indirectas

17.6%
por enfermedades hipertensivas
del embarazo

ATENCIÓN MÉDICA

76.5%
recibió atención de un
médico durante el parto

58.8%
atendió el parto en una clínica u hospital
del servicio federal o estatal de salud

CONTROL PRENATAL

5.9%
no tuvo control
prenatal durante el
embarazo

52.9%
inició el cuidado prenatal
entre el primer y tercer meses
del embarazo

29.4%
tuvo entre tres y cinco
consultas prenatales

47.1%
tuvo más de cinco
consultas prenatales

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 27.2.



ESCOLARIDAD

23.1% contaba con primaria incompleta o completa	46.2% contaba con secundaria incompleta o completa	23.1% contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
---	---	--

AFILIACIÓN

15.4%
era menor de 19 años

7.7% no tenía seguridad social ni protección a la salud	69.2% contaba con Seguro Popular
---	----------------------------------

LUGAR DE OCURRENCIA

84.6%
vivía en unión libre o era casada

76.9% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
7.7% en el hogar
7.7% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

92.3%
contó con asistencia médica

100%
de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

76.9%
se dedicaba al hogar

CONTROL PRENATAL

23.1%
no tuvo control prenatal durante el embarazo

53.8%
inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

CAUSAS

38.5% murió por causas obstétricas indirectas	15.4% por hemorragia del embarazo, parto y puerperio	30.8% por enfermedades hipertensivas del embarazo	15.4% por aborto
--	---	--	---------------------

ATENCIÓN MÉDICA

84.6% recibió atención de un médico durante el parto
69.2% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
15.4% atendió el parto en una unidad médica privada

23.1%
tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

53.8%
tuvo más de cinco consultas prenatales

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 51.5.



ESCOLARIDAD

30.5%	22.0%	25.4%
contaba con primaria incompleta o completa	contaba con secundaria incompleta o completa	contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa

AFILIACIÓN

11.9%
era menor de 19 años

13.6%	no tenía seguridad social ni protección a la salud	52.5%	contaba con Seguro Popular
-------	--	-------	----------------------------

79.7%
vivía en unión libre o era casada

LUGAR DE OCURRENCIA

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

6.8%
era hablante de lengua indígena

47.5%	murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
28.8%	en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
13.6%	en unidad medica privada
5.1%	en la vía pública
5.1%	en el hogar

89.8%
contó con asistencia médica

61.0%
se dedicaba al hogar

93.2%
de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

CAUSAS

27.1%
murió por causas obstétricas indirectas

18.6%
por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

18.6%
por enfermedades hipertensivas del embarazo

10.2%
por aborto

22.0%
no tuvo control prenatal durante el embarazo

45.8%
inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

ATENCIÓN MÉDICA

71.2%
recibió atención de un médico durante el parto

5.1%
recibió atención de una partera

28.8%
atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

8.5%
atendió el parto en el hogar

32.2%
tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

23.7%
tuvo más de cinco consultas prenatales

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050. Versión Censo 2010 es de 41.7.



ESCOLARIDAD

35.3% contaba con primaria incompleta o completa	23.5% contaba con secundaria incompleta o completa	41.2% contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
--	--	---

AFILIACIÓN

88.2% contaba con Seguro Popular	5.9% contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR
---	---

CAUSAS

17.6% murió por enfermedades hipertensivas del embarazo
29.4% por causas obstétricas indirectas
17.6% por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto
11.8% por aborto
17.6% murió por hemorragia del embarazo, parto y puerperio

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

76.5%
contó con asistencia médica

100%
de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

CONTROL PRENATAL

17.6%
no tuvo control prenatal durante el embarazo

52.9%
inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo

23.5%
tuvo entre tres y cinco consultas prenatales

29.4%
tuvo más de cinco consultas prenatales

LUGAR DE OCURRENCIA

82.4% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	11.8% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social	5.9% en el hogar
---	--	----------------------------

ATENCIÓN MÉDICA

94.1% recibió atención de un médico durante el parto	88.2% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud
--	--

41.2%

tenía entre 19 y 24 años

82.4%

vivía en unión libre o era casada

64.7%

se dedicaba al hogar

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 42.6.



ESCOLARIDAD

30.0% contaba con primaria incompleta o completa	30.0% contaba con secundaria incompleta o completa	10.0% contaba con bachillerato o preparatoria incompleta o completa
--	--	---

LUGAR DE OCURRENCIA

10.0%
tenía entre 19 y 24 años

50.0% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	30.0% en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social
--	---

AFILIACIÓN

90.0%
vivía en unión libre o era casada

20.0% contaba con seguro en salud del IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o SEMAR
60.0% contaba con Seguro Popular
10.0% contaba con IMSS-Oportunidades
10.0% no tenía seguridad social ni protección a la salud

90.0%
se dedicaba al hogar

ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO

80.0%
contó con asistencia médica

100.0%
de los casos tuvo certificado otorgado por un médico

ATENCIÓN MÉDICA

70.0%
recibió atención de un médico durante el parto

30.0%
atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud

CAUSAS

30.0% murió por causas obstétricas indirectas	20.0% por hemorragia del embarazo, parto y puerperio	20.0% por enfermedades hipertensivas del embarazo	20.0% por aborto
---	--	---	----------------------------

CONTROL PRENATAL

20.0%	inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo
30.0%	tuvo más de cinco consultas prenatales

30.0%
atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social

* Calculada con certificados de nacimiento, SINAC.

Nota: La RMM calculada con la actualización de nacidos vivos estimados de las proyecciones de población del CONAPO 2010-2050, Versión Censo 2010 es de 32.1.

POR TIPO DE AFILIACIÓN EN SALUD

NO AFILIADAS A ALGÚN SERVICIO DE SALUD

111 MUERTES EN 2014

<p>52.2% murió en Chiapas, Estado de México, Distrito Federal y Veracruz</p>	<p>ESCOLARIDAD</p>	
<p>12.6% era menor de 19 años</p>	<p>31.5% contaba con primaria incompleta o completa</p>	<p>24.3% tenía secundaria incompleta o completa</p>
<p>15.3% era hablante de lengua indígena</p>	<p>LUGAR DE OCURRENCIA</p>	
<p>80.2% vivía en unión libre o era casada</p>	<p>49.5% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</p>	<p>23.4% en una unidad médica privada</p>
<p>58.6% se dedicaba al hogar</p>	<p>16.2% en la vía pública</p>	
	<p>ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO</p>	
	<p>81.1% contó con asistencia médica</p>	<p>97.3% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>
<p>CONTROL PRENATAL</p>		<p>CAUSAS</p>
<p>19.8% no tuvo control prenatal durante el embarazo</p>		<p>20.7% por hemorragia del embarazo, parto y puerperio</p>
<p>42.3% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p>		<p>16.2% por enfermedades hipertensivas del embarazo</p>
<p>24.3% tuvo entre tres y cinco consultas prenatales</p>		<p>14.4% por aborto</p>
<p>ATENCIÓN MÉDICA</p>		<p>14.4% por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto</p>
<p>57.7% recibió atención de un médico durante el parto</p>	<p>32.4% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</p>	

DERECHO HABIENTE DEL IMSS

170 MUERTES EN 2014

<p>21.1% murió en el Estado de México y Jalisco</p> <hr/> <p>1.8% era menor de 19 años</p> <hr/> <p>1.8% era hablante de lengua indígena</p> <hr/> <p>82.9% vivía en unión libre o era casada</p> <hr/> <p>42.4% se dedicaba al hogar</p>	<p>ESCOLARIDAD</p> <hr/> <p>30.6% tenía secundaria incompleta o completa</p> <p>31.2% tenía bachillerato o preparatoria incompleta o completa</p> <hr/> <p>LUGAR DE OCURRENCIA</p> <hr/> <table border="0"> <tr> <td>78.2% murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social</td> <td>7.6% en la vía pública</td> <td>5.3% en una unidad médica privada</td> </tr> </table> <hr/> <p>ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO</p> <hr/> <p>92.9% contó con asistencia médica</p> <p>97.6% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>	78.2% murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social	7.6% en la vía pública	5.3% en una unidad médica privada
78.2% murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social	7.6% en la vía pública	5.3% en una unidad médica privada		
<p>CONTROL PRENATAL</p> <hr/> <p>14.1% no tuvo control prenatal durante el embarazo</p> <p>55.9% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p> <p>39.4% tuvo más de cinco consultas prenatales</p> <hr/> <p>ATENCIÓN MÉDICA</p> <hr/> <table border="0"> <tr> <td>80.6% recibió atención de un médico durante el parto</td> <td>70.0% se atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social</td> </tr> </table>	80.6% recibió atención de un médico durante el parto	70.0% se atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social	<p>CAUSAS</p> <hr/> <p>40.0% por causas obstétricas indirectas</p> <hr/> <p>20.0% por enfermedades hipertensivas del embarazo</p> <hr/> <p>15.3% por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto</p> <hr/> <p>9.4% por aborto</p>	
80.6% recibió atención de un médico durante el parto	70.0% se atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social			

DERECHO HABIENTE DEL ISSSTE

30 MUERTES EN 2014

<p>33.3% murió en el Distrito Federal y Oaxaca</p> <hr/> <p>0.0% era menor de 19 años</p> <hr/> <p>36.7% tenía entre 30 y 34 años</p> <hr/> <p>0.0% era hablante de lengua indígena</p> <hr/> <p>83.3% vivía en unión libre o era casada</p> <hr/> <p>23.3% se dedicaba al hogar</p>	<p>ESCOLARIDAD</p> <hr/> <p>23.3% tenía bachillerato o preparatoria incompleta o completa</p> <p>60.0% contaba con estudios profesionales</p> <hr/> <p>LUGAR DE OCURRENCIA</p> <hr/> <p>66.7% murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social</p> <hr/> <p>16.7% en una unidad médica privada</p> <hr/> <p>10.0% en la vía pública</p>		<p>ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO</p> <hr/> <p>93.3% contó con asistencia médica</p> <hr/> <p>93.3% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p> <hr/> <p>CAUSAS</p> <hr/> <p>26.7% murió por causas obstétricas indirectas</p> <hr/> <p>20.0% por enfermedades hipertensivas del embarazo</p> <hr/> <p>16.7% por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto</p> <hr/> <p>13.3% por aborto</p>		
<p>CONTROL PRENATAL</p> <hr/> <table border="1"> <tr> <td> <p>13.3% no tuvo control prenatal durante el embarazo</p> </td> <td> <p>50.0% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p> </td> <td> <p>33.3% tuvo más de cinco consultas prenatales</p> </td> </tr> </table>			<p>13.3% no tuvo control prenatal durante el embarazo</p>	<p>50.0% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p>	<p>33.3% tuvo más de cinco consultas prenatales</p>
<p>13.3% no tuvo control prenatal durante el embarazo</p>	<p>50.0% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p>	<p>33.3% tuvo más de cinco consultas prenatales</p>			
<p>ATENCIÓN MÉDICA</p> <hr/> <p>76.7% recibió atención de un médico durante el parto</p> <hr/> <p>50.0% se atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social</p>					

DERECHO HABIENTE DE SEGURO POPULAR

495 MUERTES EN 2014

<p>40.0% murió en Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas y en el Estado de México</p>	<p>ESCOLARIDAD</p>	
<p>13.3% era menor de 19 años</p>	<p>35.2% contaba con primaria incompleta o completa 35.8% tenía secundaria incompleta o completa</p>	
<p>11.1% era hablante de lengua indígena</p>	<p>LUGAR DE OCURRENCIA</p>	
<p>82.0% vivía en unión libre o era casada</p>	<p>80.0% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</p>	<p>7.5% en la vía pública 4.4% en una unidad médica privada</p>
<p>70.9% se dedicaba al hogar</p>	<p>ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO</p>	
<p>CONTROL PRENATAL</p>		
<p>13.9% no tuvo control prenatal durante el embarazo 43.6% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo 29.5% tuvo más de cinco consultas prenatales</p>		
<p>ATENCIÓN MÉDICA</p>		
<p>73.5% recibió atención de un médico durante el parto</p>	<p>64.0% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</p>	
<p>CAUSAS</p>		
<p>31.5% murió por causas obstétricas indirectas</p>		
<p>22.6% por enfermedades hipertensivas del embarazo</p>		
<p>14.5% por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto</p>		
<p>7.5% por aborto</p>		

DERECHOHABIENTE DEL IMSS-OPORTUNIDADES

7 MUERTES EN 2014

<p>57.1% murió en Chiapas</p> <hr/> <p>0.0% era menor de 19 años</p> <hr/> <p>42.9% tenía entre 25 y 29 años</p> <hr/> <p>0.4% era hablante de lengua indígena</p> <hr/> <p>1.0% vivía en unión libre o era casada</p> <hr/> <p>71.4% se dedicaba al hogar</p>	<p>ESCOLARIDAD</p> <hr/> <p>42.9% contaba con primaria incompleta o completa</p> <p>28.6% tenía secundaria incompleta o completa</p>		<p>LUGAR DE OCURRENCIA</p> <hr/> <p>57.1% murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social</p> <hr/> <p>28.6% en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</p> <hr/> <p>14.3% en el hogar</p>		<p>ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO</p> <hr/> <p>0.8% contó con asistencia médica</p> <hr/> <p>100.0% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>				
<p>CONTROL PRENATAL</p> <hr/> <table border="1"> <tr> <td>0.0% no tuvo control prenatal durante el embarazo</td> <td>42.9% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</td> <td>28.6% tuvo entre una y dos consultas prenatales</td> <td>28.6% entre tres y cinco consultas prenatales</td> </tr> </table>				0.0% no tuvo control prenatal durante el embarazo	42.9% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo	28.6% tuvo entre una y dos consultas prenatales	28.6% entre tres y cinco consultas prenatales	<p>CAUSAS</p> <hr/> <p>57.1% murió hemorragia del embarazo, parto y puerperio</p> <hr/> <p>14.3% por enfermedades hipertensivas del embarazo</p> <hr/> <p>14.3% por causas obstétricas indirectas</p> <hr/> <p>14.3% por aborto</p>	
0.0% no tuvo control prenatal durante el embarazo	42.9% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo	28.6% tuvo entre una y dos consultas prenatales	28.6% entre tres y cinco consultas prenatales						
<p>ATENCIÓN MÉDICA</p> <hr/> <table border="1"> <tr> <td>57.1% se atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</td> <td>28.6% recibió atención de una partera</td> <td>28.6% en el hogar</td> </tr> </table>				57.1% se atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	28.6% recibió atención de una partera	28.6% en el hogar			
57.1% se atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	28.6% recibió atención de una partera	28.6% en el hogar							

DERECHO HABIENTE DE PEMEX, SEDENA O SEMAR

8 MUERTES EN 2014

<p>25.0% murió en Veracruz</p>	<p>ESCOLARIDAD</p>	
<p>12.5% era menor de 19 años</p>	<p>25.0% contaba con primaria incompleta o completa</p>	<p>25.0% tenía bachillerato, preparatoria incompleta o completa o más escolaridad</p>
<p>0.0% era hablante de lengua indígena</p>	<p>LUGAR DE OCURRENCIA</p>	
<p>87.5% vivía en unión libre o era casada</p>	<p>75.0% murió en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social</p>	
<p>62.5% se dedicaba al hogar</p>	<p>ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO</p>	<p>CAUSAS</p>
	<p>87.5% contó con asistencia médica</p>	<p>37.5% murió por otras complicaciones principalmente del embarazo y parto</p>
	<p>100.0% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>	<p>12.5% por enfermedades hipertensivas del embarazo</p>
<p>CONTROL PRENATAL</p>		
<p>25.0% no tuvo control prenatal durante el embarazo</p>	<p>50.0% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p>	<p>37.5% tuvo entre tres y cinco consultas prenatales</p>
<p>ATENCIÓN MÉDICA</p>		
<p>87.5% recibió atención de un médico durante el parto</p>	<p>50.0% se atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social</p>	<p>12.5% por otras complicaciones principalmente puerperales</p>
	<p>37.5% el parto fue en una unidad médica privada</p>	<p>12.5% por aborto</p>

DERECHOHABIENTE DE OTRA INSTITUCIÓN DE SALUD

6 MUERTES EN 2014

<p>100.0% murió en el Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Quintana Roo</p> <hr/> <p>16.7% era menor de 19 años</p> <hr/> <p>0.0% era hablante de lengua indígena</p> <hr/> <p>83.3% vivía en unión libre o era casada</p> <hr/> <p>50.0% se dedicaba al hogar</p>	<p>ESCOLARIDAD</p> <hr/> <p>33.3% tenía secundaria incompleta o completa</p> <p>50.0% contaba con estudios profesionales o de posgrado</p>		<p>CAUSAS</p> <hr/> <p>33.3% murió por causas obstétricas indirectas</p> <hr/> <p>16.7% por enfermedades hipertensivas del embarazo</p> <hr/> <p>16.7% por hemorragia del embarazo, parto y puerperio</p> <hr/> <p>16.7% por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto</p> <hr/> <p>16.7% por otras complicaciones principalmente puerperales</p>				
	<p>LUGAR DE OCURRENCIA</p> <hr/> <p>50.0% en una unidad médica privada</p> <p>33.3% murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</p>						
	<p>ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO</p> <hr/> <p>100.0% contó con asistencia médica</p> <hr/> <p>100.0% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>						
	<p>CONTROL PRENATAL</p> <hr/> <table border="1"> <tr> <td>0.0% no tuvo control prenatal durante el embarazo</td> <td>50.0% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</td> <td>50.0% tuvo más de cinco consultas prenatales</td> </tr> </table>			0.0% no tuvo control prenatal durante el embarazo	50.0% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo	50.0% tuvo más de cinco consultas prenatales	
	0.0% no tuvo control prenatal durante el embarazo	50.0% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo		50.0% tuvo más de cinco consultas prenatales			
	<p>ATENCIÓN MÉDICA</p> <hr/> <table border="1"> <tr> <td>83.3% recibió atención de un médico durante el parto</td> <td>33.3% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</td> <td>50.0% el parto fue en una unidad médica privada</td> </tr> </table>			83.3% recibió atención de un médico durante el parto	33.3% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	50.0% el parto fue en una unidad médica privada	
83.3% recibió atención de un médico durante el parto	33.3% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud	50.0% el parto fue en una unidad médica privada					
<p>de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>							

POR LUGAR DE OCURRENCIA DE LA DEFUNCIÓN

SERVICIOS ESTATALES Y FEDERALES DE SALUD

488 MUERTES EN 2014

<p>26.1% murió en el Distrito Federal, Estado de México y Chiapas</p>	<p>ESCOLARIDAD</p>	
<p>13.7% era menor de 19 años</p>	<p>33.6% contaba con primaria incompleta o completa</p>	
<p>10.5% era hablante de lengua indígena</p>	<p>36.7% contaba con secundaria incompleta o completa</p>	
<p>80.9% vivía en unión libre o era casada</p>	<p>AFILIACIÓN</p>	
<p>66.6% se dedicaba al hogar</p>	<p>11.3% no tenía seguridad social ni protección a la salud</p>	<p>81.1% contaba con Seguro Popular</p>
<p>ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO</p>		
<p>92.0% contó con asistencia médica</p>		
<p>97.7% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>		
<p>CONTROL PRENATAL</p>		<p>CAUSAS</p>
<p>15.8% no tuvo control prenatal durante el embarazo</p>		<p>31.8% murió por causas obstétricas indirectas</p>
<p>43.4% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p>		<p>24.4% por enfermedades hipertensivas del embarazo</p>
<p>26.6% tuvo más de cinco consultas prenatales</p>		<p>14.5% por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto</p>
<p>ATENCIÓN MÉDICA</p>		
<p>77.9% recibió atención de un médico durante el parto</p>	<p>70.9% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o esta- tal de salud</p>	
<p>9.4% por aborto</p>		

SERVICIOS DE SALUD DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

178 MUERTES EN 2014

<p>29.3% murió en Chiapas, Veracruz y el Estado de México</p> <hr/> <p>3.4% era menor de 19 años</p> <hr/> <p>3.4% era hablante de lengua indígena</p> <hr/> <p>81.5% vivía en unión libre o era casada</p> <hr/> <p>47.0% se dedicaba al hogar</p>	<p>ESCOLARIDAD</p> <hr/> <p>27.5% contaba con secundaria incompleta o completa</p> <p>34.3% tenía bachillerato o preparatoria incompleta o completa</p> <hr/> <p>AFILIACIÓN</p> <hr/> <p>74.7% era derechohabiente del IMSS</p> <p>11.2% era derechohabiente del ISSSTE</p> <hr/> <p>ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO</p> <hr/> <p>96.1% contó con asistencia médica</p> <p>98.9% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>		
	<p>CONTROL PRENATAL</p> <hr/> <p>13.5% no tuvo control prenatal durante el embarazo</p> <p>57.3% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p> <p>38.2% tuvo más de cinco consultas prenatales</p> <hr/> <p>ATENCIÓN MÉDICA</p> <hr/> <p>83.7% recibió atención de un médico durante el parto</p> <p>73.6% atendió el parto en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social</p>		<p>CAUSAS</p> <hr/> <p>36.5% murió por causas obstétricas indirectas</p> <hr/> <p>20.8% por enfermedades hipertensivas del embarazo</p> <hr/> <p>15.2% por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto</p> <hr/> <p>8.4% por aborto</p>

HOSPITALES Y CLÍNICAS PRIVADAS

74 MUERTES EN 2014

<p>56.7% murió en el Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Chihuahua y el Estado de México</p> <hr/> <p>9.5% era menor de 19 años</p> <hr/> <p>8.1% era hablante de lengua indígena</p> <hr/> <p>86.5% vivía en unión libre o era casada</p> <hr/> <p>52.7% se dedicaba al hogar</p>	<p>ESCOLARIDAD</p>		
	<p>25.7% contaba con secundaria incompleta o completa</p>	<p>21.6% tenía bachillerato o preparatoria incompleta o completa</p>	<p>31.1% contaba con estudios profesionales</p>
	<p>AFILIACIÓN</p>		
	<p>35.1% no tenía seguridad social ni protección a la salud</p>		
	<p>29.7% contaba con Seguro Popular</p>		
<p>ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO</p>			
<p>91.9% contó con asistencia médica</p>			
<p>94.6% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>			
<p>CONTROL PRENATAL</p>		<p>CAUSAS</p>	
<p>12.2% no tuvo control prenatal durante el embarazo</p>		<p>27.0% murió por causas obstétricas indirectas</p>	
<p>55.4% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p>		<p>23.0% por hemorragia del embarazo, parto y puerperio</p>	
<p>36.5% tuvo más de cinco consultas prenatales</p>		<p>17.6% por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto</p>	
<p>ATENCIÓN MÉDICA</p>			
<p>77.0% recibió atención de un médico durante el parto</p>		<p>68.9% atendió el parto en una clínica u hospital privado</p>	
<p>8.1% por aborto</p>			

<p>38.7% murió en el Estado de México, Chiapas y Guerrero</p> <hr/> <p>7.5% era menor de 19 años</p> <hr/> <p>18.8% era hablante de lengua indígena</p> <hr/> <p>80.0% vivía en unión libre o era casada</p> <hr/> <p>62.5% se dedicaba al hogar</p>	<p>ESCOLARIDAD</p> <hr/> <p>38.8% contaba con primaria incompleta o completa</p> <p>27.5% contaba con secundaria incompleta o completa</p> <hr/> <p>AFILIACIÓN</p> <hr/> <p>22.5% no tenía seguridad social ni protección a la salud</p> <p>46.3% contaba con Seguro Popular</p> <hr/> <p>ASISTENCIA Y CERTIFICADO MÉDICO</p> <hr/> <p>47.5% contó con asistencia médica</p> <p>91.3% de los casos tuvo certificado otorgado por un médico</p>
<p>CONTROL PRENATAL</p> <hr/> <p>18.8% no tuvo control prenatal durante el embarazo</p> <p>35.0% inició el cuidado prenatal entre el primer y tercer meses del embarazo</p> <p>27.5% tuvo entre tres y cinco consultas prenatales</p> <hr/> <p>ATENCIÓN MÉDICA</p> <hr/> <p>27.5% recibió atención de un médico durante el parto</p> <p>16.3% recibió atención de una partera</p> <p>12.5% atendió el parto en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud</p> <p>22.5% atendió el parto en su casa</p>	<p>CAUSAS</p> <hr/> <p>33.8% murió por causas obstétricas indirectas</p> <hr/> <p>22.5% por hemorragia del embarazo, parto y puerperio</p> <hr/> <p>11.3% por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto</p> <hr/> <p>11.3% por enfermedades hipertensivas del embarazo</p> <hr/> <p>10.0% por aborto</p>



Para mayor información consulta nuestra página:

www.omm.org.mx



o escríbenos a:

observatoriomuertematerna@gmail.com



y síguenos en *twitter*:

[@observatoriommm](https://twitter.com/observatoriommm)



y en *facebook*:

Omm En México

Observatorio de Mortalidad Materna en México
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Oficinas en la Ciudad de México:

Casa Chata: Hidalgo y Matamoros s/n, Col. Tlalpan, Deleg. Tlalpan,
México, D.F., C.P. 14000, Tel. (01-55) 5487 7100 ext. 1606

Oficinas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas:

Carretera a Chamula No. 108, Barrio La Quinta San Martín, C.P. 29247,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
Teléfonos (01 967) 674 7028 y (01 967) 674 5079

Observatorio de Mortalidad Materna en México

Freyermuth, G., Luna, M., Muños, J., 2016, Numeralia 2014. Mortalidad Materna en México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), México, 62 pp.

Fuente: Elaboración del OMM a partir de la Base de datos definitiva de Mortalidad Materna 2014, Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud, México, 2016.

Validación: José Muños
Diseño: Julieta Abeyta Torres
Revisión de cuadros: Ana Lilia Meneses

El OMM agradece la importante colaboración de la DGIS por poner a disposición de manera oportuna la base de datos 2014.

ISBN: 978-607-96775-6-5



Para mayor información consulta nuestra página:
www.omm.org.mx



o escríbenos a:
observatoriomuertematerna@gmail.com



y síguenos en *twitter*:
[@observatoriomm](https://twitter.com/observatoriomm)



y en *facebook*:
[@omm.enmexico](https://www.facebook.com/omm.enmexico)

ISBN: 978-607-96775-6-5

