



# Numeralia 2009

Mortalidad Materna en México



# Presentación

La numeralia de mortalidad materna en México para el año 2009 incluye información de la base de datos de mortalidad que, año con año, es publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y validada por la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud (SSA). Se han incluido en esta sistematización los porcentajes de datos sociodemográficos y de acceso a servicios de salud que se consideran de mayor relevancia, para que quienes estén interesados en esta problemática puedan contar con información desagregada por cada estado de la República Mexicana.<sup>1</sup>

Para la mejor comprensión de la dimensión del problema de la mortalidad materna, en cada estado se ha incluido la razón de mortalidad materna (RMM) definida como el número de defunciones de la población femenina mientras se encuentra embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo y debida a cualquier causa relacionada con, o agravada por, el embarazo mismo o su atención (con exclusión de las muertes accidentales o incidentales), en un determinado año, por cada 100 mil nacidos vivos en el mismo periodo.<sup>2</sup> Este indicador servirá para reconocer cuáles son los estados que están enfrentando de mejor manera esta situación.

<sup>1</sup> Para conocer los cuadros completos que generaron esta numeralia, favor de consultar: <http://omm.org.mx/images/stories/documentos/IndicadoresMortalidadMaterna.pdf>


<sup>2</sup> Un ejemplo sobre cómo interpretar este indicador es el siguiente: En 2009, en Zacatecas por cada 100,000 nacidos vivos fallecieron 66 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio



El número de muertes maternas considerado en el cálculo de los porcentajes de datos sociodemográficos en esta numeralia es el que se utiliza para estimar la RMM, por lo que no están contabilizadas tanto las muertes resultado del coriocarcinoma como las que ocurrieron después de 42 días del parto, es decir, las consideradas tardías. En cuanto a las causas de muerte, se distingue entre causas obstétricas directas, las cuales se refieren a aquellas enfermedades que causan la muerte y que surgen del embarazo como la hemorragia, la preeclampsia o la fiebre puerperal, y las causas obstétricas indirectas, que son aquellas enfermedades que causan la muerte y que son agravadas por la maternidad como la tuberculosis, la diabetes o la influenza.

El Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) tiene, entre sus mandatos, crear un sistema de indicadores mediante el cual sea posible llevar a cabo el análisis, la evaluación, el monitoreo y la vigilancia sistemática de procesos y resultados de políticas, estrategias, programas y servicios dirigidos a reducir la mortalidad materna, así como contar con mecanismos necesarios para garantizar el acceso a información confiable, oportuna y periódica, que haga posible su uso para el análisis y la prevención de las muertes maternas en México.

Graciela Freyermuth y Marisol Luna



# Nacional:

1,207 muertes en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **62.2**

- 13.8%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 83.1%** vivía en unión libre o era casada
- 80.8%** se dedicaba al hogar
- 9.1%** no tenía escolaridad
- 33.1%** contaba con primaria incompleta o completa
- 33.1%** no tenía seguridad social y
- 33.1%** contaba con Seguro Popular
- 9.4%** murió en su casa y
- 4.1%** en la calle u otro lugar\*
- 89.1%** contó con asistencia médica y en
- 96.9%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 21.5%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y
- 33.1%** por causas obstétricas indirectas



# Aguascalientes:

## 13 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **57.7**

- 7.7%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 76.9%** vivía en unión libre o era casada
- 92.3%** se dedicaba al hogar
- 30.8%** contaba con primaria incompleta o completa
- 23.1%** no tenía seguridad social y  
**23.1%** contaba con Seguro Popular
- 7.7%** murió en su casa
- 100%** contó con asistencia médica  
y el certificado lo otorgó un médico
- 30.8%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y  
**53.8%** por causas obstétricas indirectas



# Baja California:

## 30 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **53.8**

- 10%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 70%** vivía en unión libre o era casada
- 60%** se dedicaba al hogar
- 23.3%** contaba con primaria incompleta o completa
- 16.7%** no tenía seguridad social y  
**30%** contaba con Seguro Popular
- 3.3%** murió en su casa, en la calle u otro lugar\*
- 90%** contó con asistencia médica y en  
**100%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 16.7%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y  
**46.7%** por causas obstétricas indirectas



# Baja California Sur:

## 5 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **51.6**

- 20%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 80%** vivía en unión libre o era casada
- 80%** se dedicaba al hogar
- 40%** contaba con secundaria incompleta
- 60%** contaba con Seguro Popular
- 100%** murió en una institución médica
- 100%** contó con asistencia médica y el certificado lo otorgó un médico
- 40%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y
- 40%** por causas obstétricas indirectas



# Campeche:

## 8 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **55.5**

**12.5%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años

**87.5%** vivía en unión libre o era casada

**100%** se dedicaba al hogar

**12.5%** no tenía escolaridad y

**37.5%** contaba con primaria incompleta o completa

**25%** no tenía seguridad social y

**75%** contaba con Seguro Popular

**100%** murió en una institución de la SSA

**100%** contó con asistencia médica  
y el certificado lo otorgó un médico

**25%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y

**50%** por otras complicaciones, principalmente del embarazo y parto





# Coahuila:

## 15 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **31.9**

- 26.7%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
  - 60%** vivía en unión libre o era casada
  - 66.7%** se dedicaba al hogar
  - 20%** contaba con estudios de primaria completa
- 26.7%** no tenía seguridad social y
  - 6.7%** contaba con Seguro Popular
- 6.7%** murió en la vía pública
- 93.3%** contó con asistencia médica y en
  - 86.7%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 26.7%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y
  - 53.3%** por causas obstétricas indirectas




# Colima:

## 3 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **29.5**

- 33.3%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 33.3%** vivía en unión libre o era casada
  - 100%** se dedicaba al hogar
- 33.3%** con estudios de primaria completa
- 66.7%** no tenía seguridad social
- 33.3%** murió en su casa
- 66.7%** contó con asistencia médica y en **100%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 66.7%** murió por causas obstétricas indirectas



# Chiapas:

## 71 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **75**

- 22.5%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 88.7%** vivía en unión libre o era casada
- 88.7%** se dedicaba al hogar
- 31%** no tenía escolaridad y  
**40.9%** contaba con primaria incompleta o completa
- 42.3%** no tenía seguridad social y  
**23.9%** contaba con Seguro Popular
- 23.9%** murió en su casa o en otro lugar\*
- 74.7%** contó con asistencia médica y en  
**85.9%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 33.8%** murió por hemorragia del embarazo, parto o puerperio y  
**22.5%** por causas obstétricas indirectas



# Chihuahua:

## 55 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **92.4**

**21.8%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años

**80%** vivía en unión libre o era casada

**76.4%** se dedicaba al hogar

**25.5%** no tenía escolaridad y

**32.7%** contaba con primaria incompleta o completa

**29.1%** no tenía seguridad social y

**32.7%** contaba con Seguro Popular

**16.4%** murió en su casa

**83.6%** contó con asistencia médica y en

**96.4%** de los casos el certificado lo otorgó un médico

**23.6%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y

**30.9%** por causas obstétricas indirectas



# Distrito Federal:

## 72 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **55.4**

- 8.3%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 83.3%** vivía en unión libre o era casada
  - 75%** se dedicaba al hogar
- 2.8%** no tenía escolaridad y
  - 16.7%** contaba con primaria incompleta o completa
- 52.8%** no tenía seguridad social y
  - 9.7%** contaba con Seguro Popular
- 1.4%** murió en su casa
- 100%** contó con asistencia médica y en
  - 98.6%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 26.4%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y
  - 31.9%** por causas obstétricas indirectas



# Durango:

## 13 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **45**

- 7.7%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 92.3%** vivía en unión libre o era casada
- 84.6%** se dedicaba al hogar
- 7.7%** no tenía escolaridad y  
**23.1%** contaba con primaria completa
- 7.7%** no tenía seguridad social y  
**46.2%** contaba con Seguro Popular
- 7.7%** murió en su casa, en la calle o en otro lugar\*
- 100%** contó con asistencia médica y en  
**92.3%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 38.5%** murió por hemorragia del embarazo, parto o puerperio y  
**30.8%** por causas obstétricas indirectas



# Guanajuato:

## 60 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **60.9**

**10%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años

**86.7%** vivía en unión libre o era casada

**81.7%** se dedicaba al hogar

**3.3%** no tenía escolaridad y  
**50%** contaba con primaria incompleta o completa

**21.7%** no tenía seguridad social y  
**45%** contaba con Seguro Popular

**11.7%** murió en su casa y  
**1.7%** en la vía pública

**96.7%** contó con asistencia médica y en  
**98.3%** de los casos el certificado lo otorgó un médico

**28.3%** murió por hemorragia del embarazo, parto o puerperio y  
**28.3%** por causas obstétricas indirectas



# Guerrero:

## 68 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **107.8**

- 17.7%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 88.2%** vivía en unión libre o era casada
- 85.3%** se dedicaba al hogar
- 20.6%** no tenía escolaridad y
- 38.2%** contaba con primaria incompleta o completa
- 30.9%** no tenía seguridad social y
- 45.6%** contaba con Seguro Popular
- 25%** murió en su casa y
- 7.3%** en la calle u otro lugar\*
- 72.1%** contó con asistencia médica y en
- 98.5%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 29.4%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y
- 26.4%** por hemorragias del embarazo, parto o puerperio





# Hidalgo:

## 30 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **67.3**

**20%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años

**93.3%** vivía en unión libre o era casada

**86.7%** se dedicaba al hogar

**3.3%** no tenía escolaridad y

**50%** contaba con primaria incompleta o completa

**13.3%** no tenía seguridad social y

**60%** contaba con Seguro Popular

**3.3%** murió en su casa

**100%** contó con asistencia médica y el certificado lo otorgó un médico

**26.7%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y

**33.3%** por causas obstétricas indirectas




# Jalisco:

## 81 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **63.5**

- 6.2%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 88.9%** vivía en unión libre o era casada
- 87.7%** se dedicaba al hogar
- 1.2%** no tenía escolaridad y  
**42%** contaba con primaria incompleta o completa
- 19.8%** no tenía seguridad social y  
**38.3%** contaba con Seguro Popular
- 4.9%** murió en su casa y  
**2.5%** en otro lugar\*
- 93.8%** contó con asistencia médica y en  
**100%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 16%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y  
**33.3%** por causas obstétricas indirectas



# México:

## 166 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **63.1**

- 12.1%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 83.7%** vivía en unión libre o era casada
- 78.3%** se dedicaba al hogar
- 4.2%** no tenía escolaridad y  
**25.9%** contaba con primaria incompleta o completa
- 40.4%** no tenía seguridad social y  
**23.5%** contaba con Seguro Popular
- 7.2%** murió en su casa y  
**2.4%** en la calle u otro lugar\*
- 93.4%** contó con asistencia médica y en  
**100%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 19.9%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y  
**34.3%** por causas obstétricas indirectas



# Michoacán:

## 41 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **55.9**

**22%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años

**87.8%** vivía en unión libre o era casada

**87.8%** se dedicaba al hogar

**9.8%** no tenía escolaridad y

**51.2%** contaba con primaria incompleta o completa

**36.6%** no tenía seguridad social y

**41.5%** contaba con Seguro Popular

**9.8%** murió en su casa y

**9.7%** en la calle u otro lugar\*

**90.2%** contó con asistencia médica y en

**97.6%** de los casos el certificado lo otorgó un médico

**31.7%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y

**29.3%** por causas obstétricas indirectas



# Morelos:

## 23 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **80.7**

- 4.4%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 91.3%** vivía en unión libre o era casada
- 69.2%** se dedicaba al hogar
- 8.7%** no tenía escolaridad y  
**30.4%** contaba con primaria incompleta o completa
- 26.1%** no tenía seguridad social y  
**56.5%** contaba con Seguro Popular
- 4.4%** murió en su casa y  
**4.4%** en otro lugar\*
- 91.3%** contó con asistencia médica y en  
**100%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 43.5%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y  
**26.1%** por causas obstétricas indirectas



# Nayarit:

## 12 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **71.3**

**100%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era mayor de 19 años

**58.3%** vivía en unión libre o era casada

**83.3%** se dedicaba al hogar

**16.7%** no tenía escolaridad y

**33.3%** contaba con primaria incompleta o completa

**8.3%** no tenía seguridad social y

**66.7%** contaba con Seguro Popular

**16.7%** murió en su casa y

**8.3%** en otro lugar\*

**75%** contó con asistencia médica y en

**91.7%** de los casos el certificado lo otorgó un médico

**41.7%** murió por hemorragia durante el embarazo, parto o puerperio



# Nuevo León:

## 25 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **33**

- 20%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 84%** vivía en unión libre o era casada
- 68%** se dedicaba al hogar
- 20%** contaba con primaria incompleta o completa
- 32%** no tenía seguridad social y  
**24%** contaba con Seguro Popular
- 96%** murió en una institución pública y en  
**4%** de los casos no se especificó lugar
- 92%** contó con asistencia médica y en  
**100%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 36%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y  
**40%** por causas obstétricas indirectas



Razón de Mortalidad Materna: **98.3**

- 12.1%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 78.8%** vivía en unión libre o era casada
- 77.3%** se dedicaba al hogar
- 15.2%** no tenía escolaridad y
- 42.4%** contaba con primaria incompleta o completa
- 47%** no tenía seguridad social y
- 28.8%** contaba con Seguro Popular
- 16.7%** murió en su casa y
- 9.1%** en la calle u otro lugar\*
- 80.3%** contó con asistencia médica y en
- 92.4%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 24.4%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y
- 28.8%** por causas obstétricas indirectas





# Puebla:

## 78 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **70.1**

- 11.5%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 84.6%** vivía en unión libre o era casada
- 87.2%** se dedicaba al hogar
- 10.3%** no tenía escolaridad y  
**38.5%** contaba con primaria incompleta o completa
- 50%** no tenía seguridad social y  
**19.1%** contaba con Seguro Popular
- 12.8%** murió en su casa y  
**1.3%** en la calle u otro lugar\*
- 89%** contó con asistencia médica y en  
**96.2%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 29.5%** murió por hemorragia del embarazo, parto o puerperio y  
**41%** por causas obstétricas indirectas



# Querétaro:

## 12 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **37.2**

- 16.7%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 83.3%** vivía en unión libre o era casada
- 83.3%** se dedicaba al hogar
- 83.3%** no tenía escolaridad y  
**41.7%** contaba con primaria completa
- 58.3%** no tenía seguridad social y  
**33.3%** contaba con Seguro Popular
- 8.3%** murió en su casa y  
**8.3%** en la calle
- 83.3%** contó con asistencia médica y en  
**100%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 33.3%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y  
**50%** por causas obstétricas indirectas



# Quintana Roo:

## 10 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **38.5**

- 30%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 80%** vivía en unión libre o era casada
- 70%** se dedicaba al hogar
- 20%** contaba con primaria incompleta
- 30%** no tenía seguridad social y  
**30%** contaba con Seguro Popular
- 100%** murió en una institución médica
- 100%** contó con asistencia médica y en  
**90%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 20%** murió por aborto y  
**60%** por causas obstétricas indirectas



# San Luis Potosí:

## 28 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **59.2**

- 14.3%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 75%** vivía en unión libre o era casada
- 85.7%** se dedicaba al hogar
- 28.6%** contaba con primaria incompleta o completa
- 32.1%** no tenía seguridad social y
- 35.7%** contaba con Seguro Popular
- 7.1%** murió en su casa y
- 21.4%** en la calle
- 87.5%** contó con asistencia médica y en
- 100%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 21.4%** murió por hemorragia del embarazo, parto o puerperio y
- 39.3%** por causas obstétricas indirectas



# Sinaloa:

## 18 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **40**

- 11.1%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 88.9%** vivía en unión libre o era casada
- 72.2%** se dedicaba al hogar
- 11.1%** contaba con primaria incompleta o completa
- 66.7%** contaba con Seguro Popular
- 5.6%** murió en su casa
- 94%** contó con asistencia médica y en **100%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 22.2%** murió por otras complicaciones del embarazo y parto y **55.6%** por causas obstétricas indirectas




# Sonora:

## 21 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **47.9**

- 14.3%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 100%** vivía en unión libre o era casada
  - 81%** se dedicaba al hogar
  - 9.5%** no tenía escolaridad y
  - 19.1%** contaba con primaria incompleta o completa
- 28.6%** no tenía seguridad social y
- 28.6%** contaba con Seguro Popular
  - 4.6%** murió en su casa, en la calle u otro lugar\*
- 95.2%** contó con asistencia médica y en
- 100%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 23.8%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y
- 52.4%** por causas obstétricas indirectas



# Tabasco:

## 23 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **60.1**

- 8.7%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 82.6%** vivía en unión libre o era casada
  - 87%** se dedicaba al hogar
  - 4.4%** no tenía escolaridad y
  - 26.1%** contaba con primaria incompleta o completa
  - 21.7%** no tenía seguridad social y
  - 56.5%** contaba con Seguro Popular
  - 17.4%** murió en su casa y
  - 8.8%** en la calle u otro lugar\*
  - 87%** contó con asistencia médica y en
  - 95.7%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
  - 21.7%** murió por hemorragia del embarazo, parto o puerperio y
  - 47.8%** por causas obstétricas indirectas



# Tamaulipas:

## 24 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **43**

**4.2%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años

**75%** vivía en unión libre o era casada

**37.5%** se dedicaba al hogar

**4.2%** no tenía escolaridad y

**25%** contaba con primaria incompleta o completa

**20.8%** no tenía seguridad social y

**33.3%** contaba con Seguro Popular

**100%** murió en una institución médica

**91.7%** contó con asistencia médica y en

**87.5%** de los casos el certificado lo otorgó un médico

**29.2%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y

**25%** por causas obstétricas indirectas





# Tlaxcala:

## 11 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **50**

- 100%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era mayor de 19 años
- 100%** vivía en unión libre o era casada
- 81.8%** se dedicaba al hogar
- 36.4%** contaba con primaria incompleta o completa
- 9.1%** no tenía seguridad social y  
**36.4%** contaba con Seguro Popular
- 90.9%** murió en una institución médica y  
**9.1%** de los casos no se especificó el lugar
- 100%** contó con asistencia médica  
y el certificado lo otorgó un médico
- 27.3%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo,  
**27.3%** murió por otras complicaciones del embarazo y parto, y  
**27.3%** por causas obstétricas indirectas




# Veracruz:

## 93 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **72.5**

- 16.1%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 69.9%** vivía en unión libre o era casada
  - 85%** se dedicaba al hogar
- 11.8%** no tenía escolaridad y
- 30.1%** contaba con primaria incompleta o completa
- 36.6%** no tenía seguridad social y
- 35.5%** contaba con Seguro Popular
  - 8.6%** murió en su casa y
  - 4.3%** en la calle u otro lugar\*
- 86%** contó con asistencia médica y en
- 95.7%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 23.7%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y
- 25.8%** por causas obstétricas indirectas



# Yucatán:

## 15 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **44.9**

- 26.7%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 86.7%** vivía en unión libre o era casada
- 93.3%** se dedicaba al hogar
- 13.3%** no tenía escolaridad y  
**26.7%** contaba con primaria incompleta
- 20%** no tenía seguridad social y  
**53.3%** contaba con Seguro Popular
- 13.3%** murió en su casa y  
**6.7%** en la calle
- 73.3%** contó con asistencia médica y en  
**100%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 33.3%** murió por hemorragia del embarazo, parto o puerperio y  
**46.7%** por causas obstétricas indirectas



# Zacatecas:

## 17 defunciones en 2009

Razón de Mortalidad Materna: **66**

- 17.7%** de las mujeres fallecidas por muerte materna era menor de 19 años
- 94.1%** vivía en unión libre o era casada
- 94.1%** se dedicaba al hogar
- 5.9%** no tenía escolaridad y
- 35.3%** contaba con primaria incompleta o completa
- 29.4%** no tenía seguridad social y
- 29.4%** contaba con Seguro Popular
- 5.9%** murió en su casa
- 94.1%** contó con asistencia médica y en
- 100%** de los casos el certificado lo otorgó un médico
- 23.5%** murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y
- 47.1%** por causas obstétricas indirectas



312.2272  
M449

Fuente: Elaboración con base en la información proporcionada por la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Secretaría de Salud (SSA), México, 2010.

Numeralia 2009. Mortalidad Materna en México  
Observatorio de Mortalidad Materna

Freyermuth, Graciela, Luna, Marisol, 2010, *Mortalidad materna en México. Numeralia*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Observatorio de Mortalidad Materna (OMM), 36 p.

Esta publicación contó con apoyo financiero del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la Organización Panamericana de la Salud en México (OPS), El Fondo para la Población de Naciones Unidas en México (UNFPA) y el Observatorio de Mortalidad Materna, 2010.

\*Nota aclaratoria: Los valores reportados en la base de datos para la variable lugar de ocurrencia de la defunción son: 0 se ignora; 1 SSA; 2 IMSS Oportunidades; 3 IMSS; 4 ISSSTE; 5 PEMEX; 6 SEDENA; 7 SEMAR; 8 otra unidad pública; 9 unidad médica privada; 10 vía pública; 11 hogar; 12 otro lugar. Este último valor corresponde al sentido que se le otorga a "otro lugar" a lo largo de esta numeralia, es decir, un lugar distinto a las 12 primeras categorías antes mencionadas.

ISBN: 978-607-59199-8-8

